

**A évoquer devant un des signes suivants :**

- Diarrhée subaiguë ou chronique
- Autres troubles digestifs chroniques

**Chez des patients asymptomatiques :**

- bilan d'une hyperéosinophilie
- voire bilan de retour de voyage (à faire au moins 3-4 semaines après le retour) ou d'arrivée en France à partir d'une zone d'endémie

**Demander :**

- « **Scotch test anal** » : oxyures ou *Taenia saginata* (les causes les plus fréquentes en France)  
Cf. Préparation du patient au scotch test anal
- « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2/3 jours d'intervalle)  
Cf. Réalisation des prélèvements : Selles pour examen parasitologique

**voyage ou séjour en zone tropicale** : préciser « **recherche d'anguillule\*** » et acheminer rapidement les selles au laboratoire sans les mettre au réfrigérateur

**suspicion d'amébose (glaires, sang)** : selles acheminées en moins de 60 min ; prévenir le service de parasitologie (53915 - heures ouvrables)

**diarrhée liquide parfois associée à de la fièvre et/ou immunodépression** : préciser « **recherche de cryptosporidies** » et « **recherche de microsporidies** »

**EN CAS DE NEGATIVITE**

**CHEZ UN PATIENT N'AYANT JAMAIS QUITTE  
LA FRANCE METROPOLITAINE**

**Si hyperéosinophilie :**

- En fonction du contexte, des **sérologies** peuvent se discuter (*Toxocarose, Distomatose, Trichinellose...*) contacter le secteur de parasitologie
- renouveler les « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2-3 jours d'intervalle), 1 mois après la première série, pour tenir compte de la phase d'invasion ou de maturation des helminthes.

**CHEZ UN PATIENT AYANT VECU OU  
SÉJOURNE EN ZONE INTERTROPICALE**

**Si hyperéosinophilie :**

- renouveler les « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2-3 jours d'intervalle), 1 mois après la première série, pour tenir compte de la phase d'invasion ou de maturation des helminthes.
- préciser « **recherche d'anguillules** »
- En fonction du contexte, des **sérologies** peuvent se discuter (*Schistomose, filariose, anguillulose...*) contacter le secteur de parasitologie

**EN POST THERAPEUTIQUE** (1 à 3 mois selon le parasite) :

- une « **Parasitologie des selles** » à 3 reprises (à 2-3 jours d'intervalle)

\* Recherche systématique avant tout traitement immunosuppresseur chez un patient à risque