

PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN PRIORITÉ

Mme/M.	Tél
Médecin traitant	Tél
Spécialiste traitant	Tél
Suivi(e) par le centre de	Tél



orphanet



www.fimarad.org



CARTE D'URGENCE Emergency card

En raison d'une maladie à IgA linéaire

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

La maladie à IgA linéaire est une maladie donnant des bulles et des lésions urticariennes sur la peau et plus rarement sur les muqueuses.
Il faut éviter les pansements adhésifs qui risquent de déchirer la peau en raison de sa fragilité.
La maladie se traite par des applications locales de corticoïdes (crème Dermoval) ou de la disulone. Certains patients peuvent recevoir, en association ou à la place de la corticothérapie locale et de la disulone des immunosuppresseurs.

Le traitement corticoïde est souvent associé à un régime sans sel et à la prise de médicaments type biphosphonates ou protecteurs gastriques.
Les traitements doivent être poursuivis plusieurs mois même une fois que la peau est redevenue normale.
Arrêter le traitement de façon inopinée, expose à un risque très élevé de rechute de la maladie.
Une surveillance régulière des prises de sang est nécessaire et le traitement ne doit absolument pas être arrêté sans avis médical.