

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
DEPIST CIB-SYST DG	Pertinence du dépistage systématique du diabète gestationnel	Début : 1/02/2020 Fin : 02/05/2020	Principal : Evaluation de l'intérêt du dépistage chez les patientes sans facteur de risque, Secondaires : 1. Respect du type d'antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR 2. Validation de l'antibioprophylaxie, ou de l'absence d'antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie, 3. Impact sur la survenue d'une ISO,	Thèse de Bibi Roohi JOOMAYE encadré par le Dr TICAUD-BOILEAU Nathalie et Dr Pierre Yves AUBARD	Femmes avec un diabète gestationnel mais n'ayant pas été dépisté, ayant accouché à l'HME entre 2016 et 2018
POPSUD	Etude PiOte de description des taux de cicatrisation des Ulcères digitaux dans la sclérodémie systémique	Début : 02/05/2020; Fin : 02/05/2022	Objectif Principal - Evaluer le taux d'UD cicatrisés à la fin de l'étude (M12) Objectifs secondaires - Evaluer mensuellement le taux d'UD cicatrisés de M0 à M11 - Evaluer le temps de cicatrisation de chaque ulcère, globalement et par sous-groupe (ulcère sur la main dominante / ulcère sur la main non dominante) - Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la douleur à M0 - Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la fonctionnalité de la main à M0 - Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la différence de qualité de vie entre M0 et la visite de fin d'étude (cicatrisation complète du patient) - Evaluer l'association entre la fonctionnalité de la main à M0 et l'observance des protocoles de soins globale - Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et les variables suivantes : l'âge, le sexe, la durée d'évolution de la maladie, la fonctionnalité de la main à M0, l'observance globale des protocoles de soins	Noemie MARCHAT	Patient (>18 ans) atteint d'une sclérodémie systémique selon les critères ACR/EULAR 2012 et présentant un ou plusieurs ulcères digitaux actifs
BEDSIDE 2	Performance diagnostique de l'échocardiographie niveau intermédiaire réalisée par des médecins urgentistes après une formation ciblée	Début: 01/03/2021 Fin : 01/03/2022	Principal : Déterminer la concordance des réponses aux questions cliniques simples (binaires) concernant le/les mécanisme(s) d'une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë entre les médecins urgentistes récemment formés à l'échocardiographie niveau intermédiaire (ECMU 2) et le médecin expert utilisé comme référence chez les patients admis au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë quelle qu'en soit l'origine. Secondaires : 1. Déterminer la concordance entre les propositions thérapeutiques formulées par les médecins urgentistes et par le médecin expert à partir de l'évaluation hémodynamique et pleuro-pulmonaire. 2. Déterminer la prévalence des différents profils hémodynamiques et respiratoires chez les patients admis au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou une insuffisance respiratoire aiguë. 3. Déterminer la prévalence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection VG conservée chez les patients admis au SU avec une insuffisance respiratoire aiguë. 4. Comparer les profils hémodynamiques chez les patients admis au SU avec une défaillance circulatoire aiguë selon l'origine septique ou non.	Dr Thomas LAFON	Patients admis au Service des Urgences avec des signes d'insuffisance circulatoire aiguë
DIAMOND	Diamètre de l'aorte abdominale sous-rénale chez la femme en population générale : dimensions moyennes et facteurs déterminants	Début : 1,02,2020 Fin : 15,10,2020	Principal : Déterminer des valeurs normales de diamètre de l'aorte abdominale sous rénale chez la femme Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision cutanée, Secondaires : Déterminer les critères associés à une anomalie des mesures de l'aorte abdominale sous rénale chez la femme.	Thèse de Lucie CHASTAINGT sous la direction du Pr. Ph, LACROIX et Dr. A. ROUCHAUD	Femmes (≥ 18 ans) se présentant dans le service de radiologie pour bénéficier d'un scanner avec des coupes abdominales, quelque soit le motif de cet examen.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
ORTHOPE ANTIBIOTH	Etude descriptive du délai entre l'administration de l'antibioprophylaxie préopératoire et l'incision cutanée en chirurgie orthopédique au CHU de Limoges	Début : 1/02/2020 Fin : 1/02/2021	Principal : Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision cutanée Secondaires : 1. Respect du type d'antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR; 2. Validation de l'antibioprophylaxie, ou de l'absence d'antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie; 3. Impact sur la survenue d'une infection du site opératoire (ISO)	Etude (EPP) de Armand ALAIN encadrée par le Dr. PS MARCHEIX	Patients pris en charge en chirurgie orthopédique au CHU de Limoges pour des chirurgies "propre" ou "propre contaminée" selon les classes d'ALTEMIER. Intervention chirurgicale dite programmée.
FEMUR FRACT	Etude prospective observationnelle du délai de prise en charge chirurgical des fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez le sujet âgé de plus de 75 ans au CHU de Limoges avec un score "At-risk" entre 50 et 120	Début : 1/02/2020 Fin : 1/08/2021	Objectiver le taux de patients présentant une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ayant un score "At-Risk" compris entre 50 et 120 opéré à moins de 48h de leur hospitalisation.	Thèse de Armand ALAIN encadrée par le Dr. PS MARCHEIX	Sujets de plus de 75 ans avec une fracture de l'extrémité supérieure du fémur
SARCOPAN	Etude de la sarcopénie dans le cancer du pancréas	Début : 01/03/2020 Fin : 15/10/2021	Principal : Etude de la sarcopénie au moment du diagnostic de cancer du pancréas Secondaires : 1. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale sans progression, 2. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale avec récurrence, 3. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survenue de complications de la chimiothérapie et/ou de la chirurgie, 4. Evolution de la composition corporelle, 5. Quels sont les critères de sarcopénie les plus pertinents ?	Thèse de Camille SALACROUP sous la responsabilité du Dr. Pierre JESUS	Patients (>18 ans) atteints d'un cancer du pancréas (primitif), tout stade, quelque soit le traitement
SPIRIHEMATO	Le point-de-vue des patients atteints d'un cancer hématologique et de leurs proches concernant la spiritualité durant la phase curative initiale	Début : 16/03/2020 Fin : 30/04/2020	Décrire le point-de-vue et les besoins des patients ayant un diagnostic de cancer hématologique et de leurs proches envers la spiritualité. - Dégager les caractéristiques et les pratiques de la spiritualité rencontrées dans la pratique clinique à travers le point-de-vue des patients atteints de cancer hématologique et de leurs proches - Identifier les attentes des patients et de leurs proches concernant la spiritualité envers les différents professionnels de santé.	Jean TONIOLO	Patients (>18 ans) avec un diagnostic de cancer hématologique
PIC	Pressions d'orteils dans l'ischémie critique	Début : 04/02/2020; Fin : 30/10/2020	Evaluer la concordance entre la méthode sys toe et le laser doppler de la pression artérielle	Thèse de Dari LOUBNA sous la Responsabilité du Pr. Philippe LACROIX	Les personnes qui consultent ou qui sont hospitalisées pour une Artériopathie Obstructive des Membres Inférieurs (AOMI) avec suspicion d'ischémie critique (douleur ou ulcère du membre inférieur).

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
REA-3D-VD	Évaluation de la fonction ventriculaire droite par échocardiographie tridimensionnelle en réanimation.	Début:23/04/2020 Fin: 23/04/2023	<p>Principal Comparer les paramètres de fonction systolique VD conventionnels (obtenus en échocardiographie 2D, en mode TM et en Doppler tissulaire) et la FEVD mesurée en ETT 3D dans une population de patients de réanimation à haut risque d'IVD.</p> <p>Secondaires 1. Déterminer la valeur seuil des paramètres conventionnels pour identifier une dysfonction systolique VD définie par une FEVD basse (FEVD < 45%) 2. Valider l'ETO 3D pour l'évaluation quantitative de la fonction systolique VD normale et pathologique (IVD aiguë) chez le patient de réanimation ventilé sous sédation 3. Evaluer l'influence éventuelle de la cause de l'IVD aiguë (SDRA, sepsis ou choc septique, embolie pulmonaire, infarctus du VD) sur la relation entre les paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD et la FEVD mesurée en échocardiographie 3D 4. Evaluer la faisabilité et la reproductibilité de la mesure des volumes VD et de la FEVD en échocardiographie 3D, en comparaison avec celle des paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD 5. Evaluer la capacité diagnostique de l'échocardiographie 3D pour l'identification du coeur pulmonaire aigu (forme la plus sévère l'IVD) défini par une dilatation aiguë du VD (rapport des surfaces télédiastoliques VD/IVG > 0,6 en grand axe) associée à un septum paradoxal en petit axe 6. Evaluer l'impact de l'IVD identifiée par échocardiographie 3D sur la mortalité, en comparaison de l'IVD identifiée par les paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD 7. Evaluer la concordance diagnostique entre la déformation systolique (strain) du VD d'une part et la dysfonction systolique du VD identifiée en échocardiographie 3D et en échocardiographie conventionnelle d'autre part.</p>	Bruno EVRARD	Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation nécessitant une échocardiographie quelle qu'en soit l'indication et ayant une pathologie à risque d'être associée à une IVD
GERICO	Cohorte des patients Gériatrique de plus de 70 ans atteints de COVID 19.	Début: 17,04,2020 Fin: 17.04.2022	<p>Objectif principal : Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients âgés atteints du COVID 19 et hospitalisés.</p> <p>Objectifs secondaires : Etudier le devenir de ces patients à 6 et 12 mois. Evaluer la perte d'autonomie à 12 mois de l'infection COVID. Evaluer l'état nutritionnel pendant et à distance de l'infection. Déterminer le profil de fragilité des patients ayant été hospitalisés suite à une infection au Covid-19</p>	Pr A. TCHALLA	Personnes âgées de 70 ans et plus atteints du COVID 19, hospitalisées depuis le début de l'épidémie dans les services dédiés à la prise en charge du COVID 19.
ECHOVID URGENCES	Identification des phénotypes cardiovasculaires précoces précoce par échocardiographie au Service d'Urgence chez les patients suspects d'infection à Coronavirus-19 en insuffisance respiratoire aiguë	Début: 01/06/2020 Fin: 31/12/2020	Déterminer la prévalence de l'insuffisance ventriculaire droite (IVD) et de l'insuffisance ventriculaire gauche (IVG) précoce par ETT dans une population de patients admis au SU pour insuffisance respiratoire aiguë suspectée d'être en lien avec une infection à Covid-19.	Dr A, BAISSÉ	Patient admis au SU pour une suspicion d'infection respiratoire à Covid-19 et présentant des signes d'insuffisance respiratoire aiguë
MACROGRO	Maladie de Crohn et grossesse	Début: 01/11/2019 Fin: 04/2020	<p>Principal : Évaluer le taux d'accouchement prématuré chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn à l'HME de Limoges.</p> <p>Secondaire : Étudier le déroulement de la grossesse chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn. Étudier le mode et les complications de l'accouchement chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn. Étudier l'état de santé du nouveau-né à la naissance chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn.</p>	Mémoire de LACAZE Marie sous la responsabilité du Dr GEYL Sophie et du Dr JAQCUES Jérémie	Femmes atteintes de maladie de Crohn ayant accouché ou ayant fait une fausse couche à l'HME de Limoges d'avril 2009 à avril 2019.
SEDEG	Syndrome d'Ehlers-Danlos et grossesse	Début : 11.2019 Fin : 03.2021.	<p>Principal : Etudier la grossesse, l'accouchement et le post-partum immédiat chez des patientes atteintes du Syndrome d'Ehlers-Danlos.</p> <p>Secondaire : Observer le type de complications obstétricales retrouvées chez ces patientes.</p>	Mémoire de COMPAIN Annaëlle sous la responsabilité du Dr Cécile TIBERGHEN	<p>Patientes atteintes du syndrome d'Ehlers-Danlos de tout type, l'ayant déclaré et qu'il soit noté dans le dossier médical.</p> <p>Patientes suivies depuis le premier trimestre de la grossesse, et ayant accouché à l'HME de Limoges depuis 2009.</p> <p>Tous types de SED seront inclus dans l'étude.</p>

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
MEDA	Macrosomie et déclenchement artificiel	Début : 01.2020 Fin : 09.2020	Principal : Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux de dystocie des épaules, en cas de macrosomie isolée. Secondaire : Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux de lésions obstétricales du sphincter de l'anus, en cas de macrosomie isolée. Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux d'autres morbidités néonatales (fracture de la clavicule, lésions du plexus brachial), en cas de macrosomie isolée.	Mémoire de OUAB Cassandra	Les patients exposés seront les suivants : - Grossesse physiologique - Présentation céphalique - Mise en travail déclenchée artificiellement - Nouveau-né avec un poids supérieur au 90ème percentile. Les patients non exposés seront identiques, à l'exception que la mise en travail sera spontanée.
FECCo	French ESD Colorectal Cohort	debut : 01/13 fin : 12/2023	Principal : Evaluer le taux de résection R0 de la dissection sous-muqueuse pour les lésions colorectales superficielles. Secondaires : Evaluer le taux de récurrence endoscopique lors du premier contrôle endoscopique ; Evaluer le taux de résection monobloc, curative et optimale ; Evaluer le taux de complication à 30 jours ; Evaluer le taux de résection endoscopique curative sans prise en charge chirurgicale à 36 mois ; Evaluer le taux de chirurgie à 36 mois ; Evaluer le taux de récurrence à 36 mois ; Evaluer l'efficacité de la prédiction histologique des lésions colorectales superficielles traitées en fonction des outils technologiques utilisés	Dr. Jérémie JACQUES (MCU-PH)	Tous les patients de plus de 18 ans adressés pour une dissection sous muqueuse d'un polype ou d'une LST colorectale.
Oral'idée	Impact de la prise en charge de l'oralité sur le délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire.	début : 01/2013 fin : décembre 2023	Principal : Démontrer que l'acquisition de l'autonomie alimentaire est plus précoce depuis une prise en charge renforcée de l'oralité des prématurés. Secondaires : Impact de la prise en charge de l'oralité renforcée sur le poids au moment de l'acquisition de l'autonomie alimentaire Evaluation du rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur la croissance Evaluation du rôle médico-économique de la prise en charge de l'oralité renforcée Evaluation du rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur les changements des habitudes d'alimentation et de nutrition artificielle	Adeline BERENGER	Enfants prématurés (nés avant un délai strictement inférieur à 36 semaines d'aménorrhées),
IARCUIPAG	Impact de l'anémie ferriprive dans le retard de croissance intra utérin et /ou dans le petit poids pour l'âge gestationnel	debut : 06/2020 fin : 08/2020	Principal : Montrer que l'anémie par carence martiale diagnostiquée (au 6ème mois et lors du bilan pré anesthésique) et non corrigée est retrouvée chez les patientes enceintes dont le fœtus est atteint de RCIU et/ou de PAG à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges. Secondaire : Montrer que la sévérité de RCIU et/ou PAG est proportionnelle à la sévérité de l'anémie. Montrer qu'il existe une influence de la couverture sociale des patientes sur l'anémie à l'HME de Limoges. Montrer que les femmes qui présentent une anémie ferriprive ont des caractéristiques communes comme l'âge, l'IMC, la parité et un antécédent de faible poids de naissance dans la fratrie (poids de naissance < 10 ème percentile).	Mémoire de Mme SISTI Morgane sous la responsabilité du Dr FIORENZA Maryse	Patientes ayant accouchées à l'hôpital mère enfant de Limoges depuis 2009 jusqu'à Août 2019 et dont l'enfant avait un poids de naissance <10ème percentile. Dans la population de l'étude toutes les femmes enceintes devront avoir eu un hémogramme lors du bilan du 6ème mois et du bilan pré anesthésique.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
CMOFGA	Conséquences maternelles, obstétricales et fœtales de la grossesse adolescente	début : 02/20 fin : 10/2020	Principal : mettre en évidence les pathologies touchant fréquemment les adolescentes durant la grossesse. Secondaire : Observer les complications survenant fréquemment durant le travail et l'accouchement pour les futures mères adolescentes. Evaluer l'état fœtal et néonatal de ces nouveau-nés afin d'observer de probables complications. Mettre en évidence les différentes conduites à risque de ces jeunes femmes qui pourraient accroître les risques de pathologies.	Mémoire de Mme PICARD Morgane sous la responsabilité de Mme BARAILLE Agnès	patientes âgées de 14 à 19 ans, nullipares, ayant eu une grossesse unique et spontanée, dont le suivi aura été régulier et ayant accouché à l'HME de Limoges
COMPLODOM	Les complications obstétricales de l'endométriose	début : 02/20 fin : 09/20	Réaliser un état des lieux des complications obstétricales anté et per-partum chez les femmes diagnostiquées endométriosiques à l'HME de Limoges Mettre en évidence que l'accouchement prématuré est la première complication chez les femmes endométriosiques en anté-partum de l'HME de Limoges montrer que 40% des femmes endométriosiques de l'HME de Limoges accouchent par césarienne Evaluer le taux d'hémorragie de la délivrance chez les femmes endométriosiques de l'HME de Limoges Evaluer le taux de placenta prævia en anté-partum chez les femmes endométriosiques à l'HME de Limoges	Mémoire de Mme ONESIME Océane	patientes âgées de 18 à 40 ans ayant eu un diagnostic chirurgical d'endométriose, qui ont été suivies et qui ont accouchées à l'HME
NONELA	Etat des lieux des manifestations néonatales des nouveau-nés exposés au labétalol in-utéro	Début : 11/2019 Fin : 02/2020	Objectif principal Décrire l'adaptation à la vie extra-utérine chez les nouveau-nés exposés in-utéro au labétalol. Objectifs secondaires 1. Connaître la prévalence de l'hypoglycémie dans les suites de naissances chez les enfants exposés au labétalol. 2. Montrer que plus la posologie du labétalol est élevée à l'accouchement, plus les valeurs pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes. 3. Montrer que plus le traitement par labétalol est instauré précocement, plus les valeurs pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes.	Mémoire de MARTIN Edith sous la responsabilité du Dr COUBRET Anne	Patiente avec traitement d'une durée minimale de 8 jours par labétalol et dont traitement encore en cours au moment de l'accouchement dont le Suivi et accouchement à l'HME de Limoges Diagnostic d'hypertension gravidique ou de pré-éclampsie établie après 20SA Monothérapie pour l'hypertension gravidique et la pré-éclampsie
GROPTED	Grossesse prolongée et terme dépassé : état postnatal et discussion sur le déclenchement artificiel du travail	Début : 05/2020 Fin : 09/2020	Principal Montrer que les accouchements réalisés aux termes supérieurs ou égaux à 41 Semaines d'Aménorrhées (ou SA) + 6 jours n'augmentent pas significativement la morbidité néonatale mesurée par Score d'Apgar après 5 minutes de vie par rapport aux accouchements réalisés entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours. Secondaires 1. Vérifier qu'un terme d'accouchement supérieur ou égal à 41 SA + 6 jours n'augmente pas significativement le taux de césarienne et d'extraction instrumentale par rapport à un terme compris entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours. 2. Mettre en évidence que la macrosomie n'est significativement pas plus fréquente après 41 SA + 5 jours qu'entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours. 3. Montrer qu'une durée de déclenchement supérieure à 48h augmente la morbidité néonatale	Mémoire de CAMPS Emma sous la responsabilité du Dr MONS Fabienne	Patientes avec grossesse monofoetale ayant accouché à partir de 41 semaines d'aménorrhées + 1 jour à l'HME de Limoges

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
IVGCHIRGROUL	IVG chirurgicales et grossesses ultérieures	Début : 01/2020 Fin : 04/2020	<p>Principal Décrire les pathologies obstétricales et néonatales de patientes ayant au moins 3 antécédents d'IVG.</p> <p>Secondaires</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montrer que 10% des patientes présentant au moins 3 antécédents d'IVG chirurgicale accouchent prématurément. 2. Montrer que la fréquence des complications obstétricales et néonatales après au moins 3 antécédents d'IVG chez les femmes de l'HME est supérieure à celle de la population générale. 	Mémoire de VILLEDIEU Alice sous la responsabilité de Mme TIBERGHEN Cécile	Les patientes suivies à l'HME de Limoges dès le 1er trimestre de grossesse présentant au moins 3 antécédents d'IVG chirurgicales déclarés ayant accouché à l'HME de Limoges
ANTIAGE	Evaluation de l'usage des ANTibiotiques au sein d'un service de Soins Aigus de GÉriatrie	Début : 01/12/2019 Fin : 31/03/2020	<p>Principal :</p> <p>Évaluer la pertinence de la primo-prescription de l'antibiothérapie vis-à-vis d'une étiologie donnée dans un service de soins aigus de gériatrie.</p> <p>Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Évaluer les modalités d'administration de l'antibiothérapie dans un service de soins aigus de gériatrie. 2. Analyser l'étape de réévaluation dans un premier temps entre 24 et 72h, puis à 7j. 3. Évaluer chacun de ces critères (pertinence de la primo-prescription, modalités d'administration, réévaluation) selon le mode d'admission du patient, selon l'organisation du service (astreinte, gériatre) et selon le type d'infection. 4. Évaluer la consommation des antibiotiques dans le service. 	Thèse de ROUGIER Charlotte encadré par Dr Edouard DESVAUX et Dr Jérémie JOST	Tous les patients hospitalisés dans le service de soins aigus de gériatrie du CHU de Limoges ayant reçu une primo-prescription d'antibiotique à visée curative sur germes documentés ou en probabilité entre le 1er décembre 2019 -31 mars 2020.
Hartmann's reversal surgery	Identification of risk factors for morbidity and mortality after Hartmann's reversal surgery – a retrospective study from two French centers	début : 01/01/2010 fin : 31/12/2015	to identify factors influencing morbidity and postoperative mortality of Hartmann's reversal.	thèse de CHRISTOU Niki encadré par le Pr MATHONNET	les patients âgés de plus de 18 ans, correspondant à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) codant HHFA014, HHFA024 et HHFC040
EGAEUUC	Etat des lieux de la grossesse et de l'accouchement en cas d'utérus unicatriciel	Début : Mai 2020 Fin : Septembre 2020	<p>Principal :</p> <p>Évaluer la proportion de complications obstétricales anté et per-partum chez les femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Secondaires :</p> <p>Évaluer la proportion d'accouchement par césarienne dans la population des femmes porteuses d'utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Évaluer la proportion de placenta prævia dans la population des femmes porteuses d'utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Évaluer la proportion de rupture utérine dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Évaluer la proportion d'extraction instrumentale dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Évaluer la proportion d'hémorragie de la délivrance dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p>	Mémoire de DERVILLIER Maeva	Patientes porteuses d'un utérus uni-catriciel lié à une césarienne, qui ont accouché en 2019 et avec un suivi réalisé à l'HME de Limoges.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Trauma Head CT Score	Score prédictif de lésions post-traumatiques intracrâniennes au scanner après traumatisme crânien léger chez les patients de plus de 65 ans.	Début : juin 2020 Fin : octobre 2021	Principal : Dériver et calibrer un score permettant de mieux guider l'indication de scanner crânien dans la population des patients de plus de 65 ans ayant présenté un traumatisme crânien léger. Secondaire : 1. Valider le score sur une cohorte différente de validation 2. Déterminer la reproductibilité inter-observateurs de la lecture des scanners crâniens pour la détection de lésions hémorragiques post-traumatiques 3. Déterminer si la détection d'une lésion post-traumatique hémorragique est associée à une intervention neurochirurgicale. 4. Déterminer la valeur du score pour prédire une intervention neurochirurgicale.	Thèse de Jérémie DUPUIS encadré par le Dr ROUCHAUD Aymeric	Tout patient âgé de 65 ans ou plus, ayant présenté un traumatisme crânien léger à basse cinétique (chute de sa hauteur avec impact crânien) et pour lequel un scanner crânien a été réalisé en phase aiguë (<12 heures).
PFONCOLIM	Etat des lieux de la préservation de fertilité féminine dans l'indication oncologique au CHU de Limoges	Début : Mai 2020 Fin : Octobre 2020	Principal : d'évaluer nos pratiques et résultats de préservation de fertilité au sein du centre d'AMP du CHU de Limoges. Secondaires : Les types de cancers les plus fréquemment adressés en préservation La survie et le statut de rémission des patientes ayant bénéficié d'une préservation de fertilité la ré-utilisation des cortex et ovocytes préservés les limites de l'accès à la consultation d'oncofertilité la création d'une fiche de liaison pour les réunions de concertations pluridisciplinaires Etude observationnelle rétrospective et prospective, monocentrique	mémoire de Alix TORDJMAN encadré par le Dr DURAND Lise Marie	Femme âgées de moins de 43 ans avec une pathologie ancéreuse ayant bénéficié d'une préservation de fertilité
IMOCOP	Intérêt Médico-économique d'une d'Oxygénothérapie Ciblée sur l'Oxymétrie de Pouls (IMOCOP)	Début : 27/05/2020 Fin : fin 2020 ou début 2021	Principal : Evaluer si l'utilisation d'un dispositif ajustant le débit d'oxygène à la saturation du patient permet une économie en gaz médicaux. Secondaires : Evaluer la fiabilité d'une administration d'oxygène variable avec la SpO2 par rapport à une administration continue. Evaluer la sécurité d'administration d'oxygène variable selon la SpO2. Evaluer les variables conditionnant la consommation d'oxygène du patient en salle de réveil. Facteur péri-opératoire influençant la durée d'oxygénothérapie. Evaluation de la fiabilité de la machine.	Thèse de AMI Pierre-Loïc encadré par Pr NATHAN-DENIZOT	Tous les patients de plus de 18 ans arrivant en SSPI qui ont reçu une oxygénothérapie avec le système FREEO2 après anesthésie générale programmée non compliquée soit avec un débit fixe (valeur de débit décidée par le médecin présent en SSPI) soit avec un débit autorégulé selon une cible de SpO2 définie selon le jugement clinique du médecin affecté à la SSPI.
APALIM	Utilisation de l'antibiothérapie chez le sujet âgé en fin de vie : Etude rétrospective	Début : 01/2020 fin : 10/2020	Principal : évaluer la prévalence de l'utilisation des antibiotiques dans les derniers jours de vie des patients âgés hospitalisés. Secondaires : - décrire les conditions d'utilisation des antibiotiques en fin de vie (évaluer le contexte, le site infectieux, la méthode de traitement) - évaluer la décision du médecin sur la poursuite du traitement	Thèse de Benjamin FESTOU encadré par le Pr TCHALLA Achille	Patients âgés de plus de 75 ans ayant été hospitalisés plus de 72 heures entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, décédé dans les services de médecine gériatrique ou de soins palliatifs ou de SSR avec une température corporelle > 38,5°C ou < 35°C dans les 10 derniers jours de vie et une infection bactérienne suspectée OU confirmée dans les 10 derniers jours de vie
SePaRIC-Covid	Sélection des Patients atteints de Rhumatisme Inflammatoire Chronique nécessitant une prise en charge en période de pandémie COVID-19	Début : Avril 2020 Fin : Juillet 2020	Sélection des patients nécessitant un avis auprès du Rhumatologue référent suite au questionnaire téléphonique RIC-Covid19 (par téléconsultation ou consultation présenteielle).	Pr Pascale VERGNE-SALLE	Patients atteints de RIC ayant répondu au questionnaire RIC-COVID19 lors de l'appel téléphonique mis en place le service de Rhumatologie du CHU de Limoges pendant le confinement.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
URO-STOM	Comment les patients prennent-ils en charge leur urostomie au quotidien ?	Début: 01/20 Fin : 12/20	Principal : évaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des stomies et des complications cutanées éventuelles, au sein d'une série de patients porteurs de stomies urinaires non continentes. Secondaire : identifier les paramètres associés aux complications cutanées stomiales identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires	thèse du Dr BERTHERAT Walter encadré par le Pr DESCAZEAUD Aurélien	Tous les patients porteurs de stomies urinaires non continentes définitives (stomies transiléales type Bricker ou d'urostomies) consultant dans le service d'urologie du CHU et aant complété le questionnaire.
RICOVID	Etude de la réponse immunitaire chez les patients COVID-19 admis en Réanimation	Début: Fin : 09/2020	<u>Principal</u> : la covid-19 entrainent une lymphopénie globale durable <u>Secondaires</u> : - diminution fonctionnelle des lymphocytes - diminution fonctionnelle des Monocytes - corrélation entre lymphopénie et charge virale	Pr Jean FEUILLARD	Patients majeurs étant admis dans le service de Médecine Intensive en Réanimation du CHU de Limoges avec un diagnostic initial de la COVID-19
BSS-CHIR	Étude sur donnée rétrospective et prospective non-interventionnelle des modalités de prise en charge des patients opérés par une chirurgie arthroscopique de l'épaule avec un bloc interscalénique court relayé par un bloc supra-scapulaire long.	Début: 01/09/2020 Fin : 01/12/2021	<u>Principal</u> : Évaluer l'efficacité d'un bloc interscalénique court (entre 2h et 4h) relayé par un bloc supra-scapulaire long (de 72h) sur la douleur moyenne recueillie au cours des premières 24h (J1) et sur les 2 jours en post opératoire (J2 et J3). <u>Secondaires</u> : - Évaluer la réadmission pour douleurs pendant la première semaine après l'opération (J1 à J7) - Évaluer l'apparition de pics douloureux au réveil et à la sortie du bloc le jour de l'opération - Évaluer la consommation d'analgésiques (morphiniques / non morphiniques) le jour de l'opération et pendant la première semaine après l'opération (J1, J2, J3, J4 et J7) - Évaluer la douleur des patients au temps pré-opératoire (dans le mois qui précède l'opération) et à J4, J7, J15 et J30 - Évaluer la satisfaction du patient sur la prise en charge de la douleur à J30 - Évaluer la survenue de complications médicales (infections, hématome, ecchymose, allergie, algodystrophie,...) à 3 mois - Évaluer la survenue de toxicité cartilagineuse (signes de chondrolyse gléno-humérale) à 6 mois et 12 mois.	Dr Yann MARCZUK	Homme, femme entre 18 ans et 70 ans ayant eu à partir du 1 juin 2020 ou ayant besoin d'une acromioplastie ou d'une chirurgie de la coiffe des rotateurs (rupture de la coiffe ou calcification de la coiffe) ou réinsertion du bourrelet glénoïdien (intervention de Bankart)
SEROCOS	Analyse sérologique COVID-19 chez les patients hospitalisés au CHU pour Suspicion d'Infection COVID avec PCR négative et images TDM compatibles.	Début: 01/11/2020 Fin : 01/11/2021	<u>Principal</u> : améliorer les performances du scanner thoracique pour le diagnostic étiologique d'une PAC virale ou apparentée, y compris COVID-19 <u>Secondaires</u> : - Diagnostic rétrospectif sérologique des patients COVID 19 à PCR négative initiale - Diagnostic étiologique des autres agents pathogènes de PAC - Description sémiologique des scanners thoraciques - Présentation clinique et biologique des PAC	Pr Boris MELLONI	Patient majeur hospitalisé pour un tableau COVID PCR négatif à la phase initiale (période 8 mars au 10 mai 2020),
Covid-ACG	Une infection à COVID19 peut-elle être responsable de la survenue d'une artérite à cellules géantes ?	Début: 10/2020 Fin : 02/2021	<u>Principal</u> : Evaluer la positivité de la PCR SARS-CoV-2 sur les biopsies d'artère temporale (BAT) de patient suspect de GCA <u>Secondaires</u> : - Evaluer la positivité de la sérologie SARS-CoV-2 dans le sérum des patients atteints de GCA selon les critères de l'ACR - Comparer l'expression de CXCL10 et CXCR3 par RT-PCR quantitative au niveau des BAT de patients suspects de GCA en fonction de leur statut Covid-19	Dr Kim LY Dr Eric LIOZON	Hommes et femmes d'âge >50 ans ayant eu une BAT pour suspicion d'artérite à cellules géantes (GCA), entre Novembre 2019 et Juillet 2020
COPACOV	COhorte des Patients Adultes de moins 70 ans atteints du COVID19	Début : 05/2020 fin : 11/2021	principal : Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients hospitalisés atteints du COVID 19 de moins de 70 ans Secondaire : Étudier le devenir de ces patients à 6 et 12 mois Evaluer le nombre d'évènements indésirables depuis le diagnostic	Dr LY Kim	Patient de moins de 70 ans ayant été diagnostiqué COVID 19 positif par RT-PCR et/ou scanner thoracique et hospitalisé dans un service COVID entre le début de la pandémie et le 11 mai 2020

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
CEEKIT	Apport de l'échographie de contraste à 3 mois dans la stratégie de prise en charge des sujets transplantés rénaux : étude pilote	Début:12/2020 Fin:10/2021	<p>Objectif principal :</p> <p>Décrire les paramètres échographiques avec analyse de contraste au 3eme mois de la greffe rénale.</p> <p>Objectifs secondaires :</p> <p>Etudier la corrélation entre les données de l'échographie de contraste, les données biologiques et cliniques.</p>	Pr Philippe LACROIX	Patients majeurs âgés d'au moins 18 ans ayant consenti et greffés rénaux à 3 mois post transplantation
uPA-SEIN	Etude rétrospective de l'impact d'uPA/PAI-1 et PAM 50 dans la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein.	début : mai 2020 fin : octobre 2020	<p>Objectif principal :</p> <p>Comparer l'impact de PAM50 et/ou de l'uPA/PAI-1 sur les décisions de chimiothérapie</p> <p>Objectif secondaire :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluer les caractéristiques clinico-pathologiques dans chacun des groupes à risque de récurrence selon uPA/PAI-1 seul, PAM50 seul et uPA/PAI-1 et PAM50 combinés 2. Evaluer la Survie sans maladie invasive à distance (iDFS) 3. Evaluer la survie globale (SG) 	Thèse de SANCHEZ Raphael encadré par le Dr DELUCHE Elise	Patientes âgées de plus de 18 ans porteuses d'un cancer du sein infiltrant localisé sans atteinte ganglionnaire, pris en charge au CHU de LIMOGES entre janvier 2010 et décembre 2019 inclus et ayant bénéficié soit d'une analyse d'uPA/PAI1 soit de PAM 50.
DECIMALE	Comparaison du DEbit Cardiaque mesuré par échocardiographie et par therModilution trAnspulmonaire chez les patients présentant une insuffisance circuloLatoire aiguë	Début: Décembre 2020 Fin: Décembre 2023	<p>Objectif principal :</p> <p>Comparer les valeurs de débit cardiaque mesuré par échocardiographie doppler et par thermodilution transpulmonaire (PiCCO2) chez les patients de réanimation admis pour insuffisance circulatoire aiguë sous ventilation mécanique, en situation basale et au décours d'interventions thérapeutiques à visée hémodynamique.</p> <p>Objectif secondaire :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etudier la concordance des variations du débit cardiaque mesurées par les deux approches en fonction du type de modification thérapeutique instaurée (remplissage vasculaire, inotropes positifs, vasopresseurs). 2. Comparer les variations de volume ventriculaire gauche mesurées en échocardiographie 3D et en imagerie bidimensionnelle standard au décours d'interventions thérapeutiques à visée hémodynamique. 3. Evaluer l'influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur du strain longitudinal global du ventricule gauche et du strain de la paroi libre du ventricule droit 4. Evaluer l'influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur de la vitesse maximale de raccourcissement systolique et d'élongation diastolique des fibres myocardiques longitudinales du ventricule gauche mesurées en doppler tissulaire à l'anneau mitral lorsqu'une échocardiographie transthoracique (ETT) et transoesophagienne (ETO) sont réalisées successivement (ex: ETT devant être complétée par une ETO dont la capacité diagnostique est supérieure chez le patient ventilé). 	Dr Marine GOUDELIN	Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation pour une insuffisance circulatoire aiguë

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Radio-axios	Drainage sous-echoendoscopie avec prothèse d'apposition vs drainage radiologique en cas d'obstacle biliaire tumorale distal et d'échec de CPRE, étude rétrospective	Début : 05/2020 Fin: 10/2020	<p>Objectif principal : comparaison du succès clinique à un mois du drainage des voies biliaires par voie radiologique ou échoendoscopique.</p> <p>Objectif secondaire : 1.comparaison du taux de complications post geste précoces 2. comparaison des taux de survenue d'obstruction de la prothèse biliaire 3.comparaison de la survie globale 4. une comparaison médico économique des deux stratégies au cours du temps du point de vue de la sécurité sociale</p>	Dr Jérémie JACQUES	Patients souffrant d'un cancer du pancréas et décédés au moment du recueil des données
EchoVID REA	Phénotypes cardiovasculaires et respiratoires au cours du syndrome de détresse respiratoire aigu lié au COVID-19 : lien étiopathogénique et pronostique	Début: Décembre 2020 Fin:01/12/2023	<p>Objectif principal : Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire identifié en échocardiographie (notamment la présence d'un CPA) et le phénotype respiratoire (type et sévérité du SDRA) chez les patients hospitalisés en réanimation pour une pneumopathie sévère liée au COVID-19.</p> <p>Objectif secondaire : 1.Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire et respiratoire d'une part, et le pronostic d'autre part 2. Comparer la prévalence du CPA (sévère ou non) et de la dysfonction VG au cours du SDRA lié à l'épidémie de COVID-19 et au virus de la grippe sur la saison 2019-2020.</p>	Pr Philippe VIGNON	Patient majeur admis en réanimation pour une pneumopathie à COVID-19 en 2020
OESO-SARCOPENIA	Impact de la composition corporelle sur le devenir des patients porteur d'un cancer de l'œsophage.	début : Mai 2020 fin : Octobre 2020	<p>Objectif principal : Evaluer le lien entre la survie sans progression (SSP) et la composition corporelle initiale (dont la sarcopénie) évaluée au diagnostic,</p> <p>Objectif secondaire : 1. Evaluer l'évolution de la composition corporelle entre le diagnostic initial et la récurrence 2. Evaluer par intelligence artificielle, l'impact pronostic de la sarcopénie au diagnostic initial et à la récurrence 3. Evaluer le lien entre la survie globale et la composition corporelle initiale. 4. Evaluer les complications post-opératoires en fonction de la composition corporelle initiale, si chirurgie.</p>	thèse du Yacine ZOUHRY encadré par le Dr DELUCHE Elise	Patients atteints d'un cancer de l'œsophage non métastatique et pris en charge par chimiothérapie et/ou radiothérapie entre janvier 2009 et mars 2020
PULSION	Description d'un nouveau signe échocardiographique dans l'insuffisance aortique aiguë : l'hyperpulsatilité de l'aorte thoracique descendante.	début : Decembre 2020 fin : Decembre 2022	<p>L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'intérêt d'un indice d'hyperpulsatilité de l'aorte thoracique descendante en ETO dans l'insuffisance aortique aiguë.</p> <p>L'objectif secondaire est l'évaluation de la reproductibilité inter- et intra-observateur de la mesure.</p>	Dr Marine GOUDELIN	<p>Nous sélectionnerons les patients présentant, sur l'ETO, une IA moyenne ou importante (grade 3/4 ou 4/4) secondaire à une endocardite infectieuse aiguë sur valve native définie par les critères de Duke</p> <p>Les témoins seront des patients pris en charge en Réanimation Polyvalente pendant la même période et qui auront bénéficié d'une ETO pour un autre motif.</p>
DESTINEE	Mesure de la déformation longitudinale globale du ventricule gauche en échocardiographie transoesophagienne chez les patients ventilés en choc septique	début : Decembre 2020 fin : Decembre 2022	<p>L'objectif principal est d'évaluer la faisabilité du SLG du VG en ETO chez les patients en choc septique sous ventilation mécanique.</p> <p>Les objectifs secondaires comportent la reproductibilité inter- et intra-observateur de la technique, la relation entre le SLG VG et la FEVG et la relation entre le SLG du VG et la mortalité en Réanimation.</p>	Dr Marine GOUDELIN	Patient adulte hospitalisé en Réanimation pour choc septique entre janvier 2010 et décembre 2020 selon la définition Sepsis-3 et ayant bénéficié d'une ETO avec coupe des quatre cavités de qualité adéquate pour une analyse par speckle tracking dans les trois jours suivant l'admission

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
ACHROSS	ACHROMobacter Système Sécrétoire	début : Septembre 2020 fin : janvier 2022	Création d'une collection biologique de souches d'Achromobacter Xylosoxidans (Ax ; de réservoir inconnu et résistantes aux antibiotiques) et de prélèvements d'expectorations (spontanée ou induite), chez des patients atteints et non atteints de Mucoviscidose, dans la perspective de mettre en évidence une corrélation entre la présence de cette souche bactérienne Ax et la démonstration expérimentale de l'activité de leur système d'antagonisme (une nanomachine de sécrétion de type VI (T6SS),	Dr Fabien GARNIER	Patients atteints et non atteints de Mucoviscidose
BIOSUPPORT	Optimisation de la survie à long terme en transplantation d'organes : de la physiopathologie à la prise en charge optimisée des patients	début : Décembre 2020 fin : Décembre 2023	Création d'une collection biologique afin d'étudier les facteurs influençant la survie du greffon à long terme chez les patients receveurs de rein, de foie, ou de cœur au sein de la FHU	Pr, Sophie ALAIN	Patients transplantés du rein, du foie ou de cœur
MACROGOS	Etude du bénéfice du déclenchement pour macrosomie foetale à propos d'une étude rétrospective d'une série de 550 cas.	début : Janvier 2020 fin : Décembre 2020	Comparaison du taux d'accouchement par voie basse (AVB) chez les patientes déclenchées versus non déclenchées selon le "protocole macrosomie" à l'étude. - Évaluation morbi-mortalité maternelle. - Évaluation morbi-mortalité foetale.	Thèse de Manon BAUDRY sous la responsabilité du Dr Perrine COSTE MAZEAU	Patientes ayant été déclenchées pour macrosomie selon le "protocole à l'étude" et patientes ayant accouché d'un enfant macrosome, dans le service de gynécologie du Chu de Limoges, sur la période de septembre 2016 à décembre 2020,
MEDCCR	Medullary colonic carcinoma	début : Mars 2020 fin : Décembre 2020	Démontrer que le cancer médullaire colorectal est un type de cancer avec un pronostic à part entière probablement différent de l'entité histologique la plus fréquente à savoir l'adénocarcinome colorectal. Cohorte rétrospective, descriptive de 10 cas d'adénocarcinomes coliques de type médullaires, cas rares, ayant été opérés entre 2000 et 2020 au CHU de Limoges. Analyse en sous groupes à la recherche de facteurs pronostiques. Comparaison Mise en regard des données de notre cohorte avec celles de la littérature.	Thèse de Léa VEYRONE sous la responsabilité du Pr Nikki CHRISTOU	Diagnostique anatomopathologique d'adénocarcinome colorectal de type médullaire entre 2000 et 2020 ,
CMF_MW	Etude rétrospective de l'intérêt du double immunophénotypage lymphocytaire et plasmocytaire pour le diagnostic de la macroglobulinémie de Waldenström (MW).	début : Janvier 2020 fin : Février 2020	Objectif Principal : Evaluer la sensibilité et la spécificité du double immunophénotypage pour le diagnostic de MW Objectifs secondaires : 1, Optimiser la méthode d'analyse des données d'immunophénotypage des lymphocytes et des plasmocytes pour le diagnostic de MW 2, Etudier les associations / corrélations éventuelles avec les autres paramètres clinico-biologiques (intensité de la différenciation plasmocytaire, quantité d'IgM monoclonale sécrétée, ...)	Dr, David RIZZO sous la responsabilité du Pr. Jean FEUILLARD	Patients atteints d'une macroglobulinémie de Waldenström (MW : syndrome lymphoprolifératif rare) avec une prise en charge initiale dans le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire depuis 2012.
MigrCancerScreening8 7-19	Analyse épidémiologique du dépistage du cancer colorectal en France parmi les patients avec un historique migratoire	début : Octobre 2020 fin : Octobre 2021	Evaluer les taux de participation au dépistage du cancer colorectal des patients d'origine étrangère versus ceux nés en France , Evaluer la distribution régionale des patients d'origine étrangère ayant bénéficié de la campagne de dépistage du cancer colorectal sur deux ans en fonction de leur pays d'origine , Evaluer les taux de réalisation de la coloscopie en cas de positivité, ainsi que les résultats anapath de celles-ci.	Dr, Nikki CHRISTOU	Patients âgés de 50 à 74 ans orientés vers les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC)

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
URGEO	Hyperéosinophilie au service des urgences : étude épidémiologique descriptive	début : Décembre 2020 fin : Juin 2021	Objectif Principal : Déterminer la prévalence de l'hyperéosinophilie (supérieure à 1.5 G/L) sur une cohorte de patients admis au service des urgences du CHU de Limoges. Objectif(s) secondaires: 1, Déterminer quel que soit le motif d'admission les caractéristiques cliniques, anamnestiques, démographiques et biologiques précoces associées à une hyperéosinophilie. 2, Déterminer la survie à 3 mois des patients étudiés. 3 ,Déterminer des facteurs cliniques et/ou biologiques prédictifs de mortalité à 3 mois	Dr, Arthur BAISSÉ sous la responsabilité du Dr, Simon PARREAU	Tous les patients admis au service des urgences du CHU de Limoges pendant la période d'étude s'étalant de Janvier 2013 à Décembre 2018 et présentant une hyperéosinophilie (Age >18 ans),
DOC COVID 19	DOnnées Clinico biologique des patients hospitalisés en service de médecine atteint du COVID 19 au CHU de Limoges.	début : 05/2020 fin : 11/2021	Réaliser le descriptif des patients COVID + hospitalisés dans les services cliniques du CHU de Limoges Déterminer les facteurs prédictifs de mortalité et de délai de survie	Dr, Edouard DESVAUX	Étude de cohorte rétrospective au CHU de Limoges dans les services de médecine aiguë (maladies infectieuses et tropicales, polyclinique, unité COVID) ayant reçu des patients hospitalisés pour une infection à COVID 19. Patient hospitalisé dans un service de médecine au CHU de Limoges (MIT, polyclinique, unité COVID)
Uro-Stom	Comment les patients prennent-ils en charge leur urostomie au quotidien ?	début :06/2020 fin : 06/2021	Objectif principal : Evaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des stomies et des complications cutanées éventuelles, au sein d'une série de patients porteurs de stomies urinaires non continentes. Objectifs secondaires : Identifier les paramètres associés aux complications cutanées stomiales, Identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales, Evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires,	Thèse de Walter BERTHERAT sous la responsabilité du Pr, Aurélien DESCAZEAUD	Patients porteurs de stomies urinaires définitives suivis dans le service d'urologie du CHU de Limoges depuis le mois de janvier 2020,
PODIMPACT	Impact d'un protocole de service sur l'accouchement par voie basse des présentations du siège à terme. Etude rétrospective de cohorte au CHU de Limoges de janvier 2009 à septembre 2010	début :14/12/2020 fin : 30/06/2021	Objectif principal : Décrire la prise en charge de la présentation du siège à terme au CHU de Limoges depuis 2009 afin d'évaluer si la mise en place d'un protocole de service en 2015 a permis l'augmentation de la pratique de l'accouchement par voie basse des présentations du siège et si, parmi les patientes pour laquelle il est prévu une intention d'accouchement par voie basse, le taux de réussite de cette dernière a été amélioré. Objectifs secondaires : Comparer l'état néonatal des enfants entre les groupes intentions d'accouchement par voie naturelle à terme et intentions de césarienne à terme, Rechercher d'éventuels facteurs de risque d'échec à la voie basse.	Robin AMAURY sous la responsabilité de Perrine COSTE MAZEAU	Naissances en présentation du siège; Terme de naissance supérieur ou égal à 37 semaines d'aménorrhées; Grossesse monofoetale, au cours de la période : du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2020 à l'HME du CHU de Limoges,
DIABCRC	L'effet de la metformine sur la survie après chirurgie pour cancer colorectal chez les patients atteints de diabète sucré de type 2	début :28/12/2020 fin :30/06/2021	Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie globale Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie sans récidiées de la maladie [CCR]	Zeinab TARHINI (M2 Santé Publique) sous la responsabilité du Dr Niki CHRISTOU	Patients admis au sein du service de Chirurgie Digestive ayant bénéficiés d'une chirurgie pour Cancer Colorectal de 2017 à 2020
PERMACOL	La CRP post-opératoire est-elle un facteur prédictif de complications chez les patients opérés d'une cure d'événtration avec prothèse biologique ?	début :08/2020 fin :01/2021	Objectif principal : Evaluer le lien entre le taux de la CRP post-opératoire et les complications postopératoires chez les patients opérés d'une cure d'événtration avec prothèse biologique,	Abdelkader TAIBI	Tous les patients opérés d'une cure d'événtration avec mise en place d'une bioprothèse,

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
COCOA	Cohorte de patients COVID suivis en ambulatoire en Limousin	début : Avril 2020 fin : décembre 2021	Décrire chez les patients infectés par le Covid 19 en Médecine Générale les signes cliniques en termes de prévalence et d'incidence, de durée d'évolution, de mode d'évolution en fonction de la présence ou non de comorbidités et d'incidence des complications. Evaluer le vécu psychologique Confronter les résultats à ceux recueillis en milieu hospitalier afin d'améliorer nos connaissances sur cette infection et nos compétences pour la gérer.	Adeline BERTRAND sous la responsabilité de Karen RUDELLE et Nathalie DUMOITIER	Inclusion des patients suspects atteints de la Covid 19, depuis avril 2020, par le centre 15 de Limoges et par les médecins généralistes des 3 départements du Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), puis le Centre 15 Guéret et maintenant l'ensemble des médecins du GHT Limousin.
INFORDIG	Evaluation de l'INFORMATION Retenue par les patients en consultation préopératoire et son impact sur l'anxiété avant une chirurgie DIGestive, générale et endocrinienne programmée.	début : 27/06/2020 fin :26/10/2020	Objectif Principal : Déterminer si renouveler l'information préopératoire une semaine avant l'intervention, en se basant sur la « fiche Information préopératoire » de la FCVD, augmente l'assimilation de l'information en chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne. Objectifs secondaires : 1, Évaluer la veille ou le jour de l'intervention l'anxiété préopératoire selon deux échelles (APAIS et EVA-A). 2, Évaluer la veille ou le jour de l'intervention le besoin d'information selon l'échelle APAIS 3, Évaluer la veille ou le jour de l'intervention le retentissement de l'anxiété sur l'hémodynamisme préopératoire (Pression artérielle et fréquence cardiaque). □	Celia BOUNIF sous la responsabilité du Pr. Muriel MATHONNET	Patient devant bénéficier d'une chirurgie sous anesthésie générale en chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne patients âgés de plus de 18 ans
ENEWBORN	Durée d'hospitalisations chez les enfants nés à moins de 32 SA	octobre 2019 a octobre 2020	Comparaison des durées d'hospitalisation entre les enfants sortant directement du niveau 3 et les enfants retournant vers un niveau 2a ou 2b avant leur sortie à domicile	AL Blanquart sous la responsabilité du Dr PONTHER	Enfants nés à moins de 32 Semaines d'Aménorrhée
Vancoprem	Assessment of Bayesian model for Vancomycin regimen treatment in neonates.	octobre 2017 à octobre 2018	Principal : Vérifier la validité du modèle Bayésien, développé en pharmacologie (prenant en compte l'âge actuel, le poids actuel, la créatininémie et le taux de vancocinémie H48 du début du traitement antibiotique), dans l'adaptation thérapeutique pour l'atteinte des taux de vancocinémie cibles de 15 à 25mg/L.	Pauline Ensuque sous la responsabilité Dr L PONTHER	Nouveau né à terme ou prématuré bénéficiant d'un traitement par vancomycine
KT PAIN	Comparaison de la douleur lors de la pose d'un KTEC avec ou sans la présence de la maman	Juin 2020 à Juin 2022	Critère de jugement principal : MEsure des valeurs les plus élevées pour chaque enfant du score de FANS et comparaison entre dans le groupe « avec » et « sans » utilisation de la voix maternelle.	Audrey Flours sous la responsabilité du Dr MONS et dr PONTHER	Nouveauté de moins 37 SA bénéficiant de la pose d'un KTEC
SteptoB	Modification de la surveillance en maternité des nouveau-nés à risque d'infection néonatale bactérienne précoce avec la PCR streptoB	decembre 2019 à Novembre 2020	L'objectif principal de cette étude est d'évaluer si la réalisation de la PCR en per partum modifie la surveillance en maternité des nouveau-nés à risque d'infection néonatale bactérienne précoce. Les objectifs secondaires de cette étude sont d'observer l'impact de la PCR sur l'antibiothérapie per partum et d'évaluer la faisabilité de la réalisation de la PCR par les sages-femmes en salle de naissance.	AL Blanquart sous la responsabilité du Dr PONTHER	Nouveau-nés dont la mère a bénéficié d'une PCR SreptoB
	Evaluation par l'échelle d'Edimbourg du risque de dépression du post partum chez les mères d'enfants hospitalisés en néonatalogie.	Avril 2020 à avril 2021	Evaluation chiffrée de l'état psychologique des mères d'enfants hospitalisés en néonatalogie (étude de pratique courante)	L Douziech sous la responsabilité du Dr Mons Fabienne	Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie
Oral'idée	Impact du renforcement de la prise en charge de l'oralité sur le délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire	Rétrospective (grpe avant nov 2012-05/2013 et grpe après nov 2017 mai 2018)	Objectif principal : comparaison du délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire avant/après prise en charge renforcée de l'oralité. Objectifs secondaires : comparaison des durées des différentes nourritures assistées, des durées d'hospitalisation, de l'allaitement maternel et des paramètres de croissance entre les deux groupes	A Berenger sous la responsabilité du Dr Mons Fabienne	Nouveau-né prématurés sortis à domicile des unités de néonatalogie sur les périodes d'intérêt
micrositeKTC	Impact du microsite sur le nombre de ponction veineuse totale pour la pose d'un KTEC chez un nouveau-né	Rétrospective (janvier 2019-janvier 2022)	Objectif principal: Nombre de ponctions veineuses totales pour la pose de KTEC chez le nouveau-né	Hortense Miane sous la responsabilité du Dr PONTHER	Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie
reaVildol	impact de l'utilisation de la réalité virtuelle sur la douleur et l'anxiété médiées par le retrait des prothèses en réanimation pédiatrique	janvier 2022 à aout 2022	objectif principal : évaluation de la douleur secondaire au retrait de prothèses en réanimation pédiatrique (étude de pratique courante)	Domitille Lacroart sous la responsabilité du Dr Mowendabeka	enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation pédiatrique

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
	Impact du confinement lié au Covid sur l'équilibre du diabète de type 1 chez l'enfant	janvier 2020 à juin 2020	Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement	Camille Fray sous la responsabilité du Dr Ponthier	Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1
Fracture du plancher orbitaire et motricité oculaire	Étude de la relation entre la présentation scanographique d'une fracture du plancher orbitaire, les anomalies de la motricité oculaire et la nécessité d'une reconstruction chirurgicale.	début : 01/06/2020 fin :01/10/2021	Chercher la relation entre la survenue d'une diplopie verticale lors d'une fracture du plancher de l'orbite de type "blow out" " isolée et une mesure scanographique simple et reproductible,	Esther PAGES sous la responsabilité du Dr, Joël BRIE	Patients adressés en consultation en chirurgie maxillo-faciale pour une fracture du plancher orbitaire (type « blow out") isolée.
INSPIRE	Suivi de la colonisation respiratoire des patients intubés	début : Fev 2020 fin :Fév 2022	Principaux > Etudier la dynamique évolutive des sécrétions endotrachéales en termes de volume, coloration et microbiote au cours de la ventilation mécanique invasive ; et leur corrélation avec le score CPIS Secondaires > Analyser la relation entre les variations clinico-microbiologiques retrouvées et la survenue d'évènements infectieux (pneumopathie acquise sous ventilation mécanique précoce, trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique)	Dr Estelle DANCHE	Les sujets seront des patients admis dans le service de Réanimation Polyvalente du CHU de Limoges.
IVACOV	Intention de Vaccination au COroNaVirus chez les soignants	début : sept 2020 fin: sept 2021	Objectif principal : Identifier les facteurs de frein à la vaccination Objectif secondaire : Comparer l'intention de vaccination à la grippe à celle pour le coronavirus 2019 Comparer l'intention vaccinale selon la fonction hospitalière (Médecin / Infirmières) et selon le rôle du service (service COVID/service non COVID),	Dr David VANDROUX	Soignants médicaux et paramédicaux en poste stable (> 3mois) des services suivants: réanimation cardiothoracique, réanimation polyvalente, maladies infectieuses, chirurgie cardiaque
COSINUS	Facteurs pronostiques des sinusites aiguës compliquées de l'enfant : étude rétrospective de 2010 à 2020 au CHU de Limoges	début : Décembre 2020 fin :février 2021	Objectif Principal : Recherche de facteur de risque de complication chez les enfants hospitalisés pour RA Objectifs secondaires : 1, Facteurs associés avec la nécessité d'un traitement chirurgical ou l'échec d'un traitement médico-chirurgical bien conduit 2, Mettre en évidence une augmentation dans le temps des complications intra-craniennes et tenter de l'expliquer 3, Proposer de nouveaux critères amenant à suspecter une RA compliquée chez un patient consultant aux urgences	Lucie CUSSINET sous la responsabilité du Pr, Karine AUBRY	Patients âgés de moins de 18 ans, hospitalisés pour rhinosinusite aigüe, du 1/1/10 au 31/12/20,
PERIFILL	Evaluation de l'efficacité et de l'inocuité du lipofilling périnéal en cas de douleur post accouchement	début : Février 2021 fin : Juin 2021	Objectif principal : Evaluation de la douleur et la recerchne de complications Objectifs secondaires : 1, Rechercher une amélioration globale de la qualité de vie à 3 mois, 6 mois, 1 an 2, Rechercher une amélioration du bien être sexuel 3, Rechercher amélioration de l'incontinence	Thèse de BEN RHAJEM Sami sous la responsabilité du Dr Hugues CALY	Patientes avec une grossesse monofoetale ayant bénéficié d'un lipofilling périnéal ayant accouchées à l'HME du CHU de Limoges,
FERIV/FERPO-parturientes	Intérêt du fer IV dans la prise en charge de l'anémie chez les parturientes	début : fin :février 2021			
Infertilité Utérine	Étude pilote territoriale sur la prévalence et l'itinéraire thérapeutique des patientes présentant une infertilité utérine	Fév. 2021 - Mai 2021	- Principal : Compréhension du comportement des patientes ayant une infertilité utérine en ce qui concerne leur parcours de soins. L'approche sera à la fois qualitative avec la description de l'itinéraire thérapeutique des patientes et le détail de leur prise en charge, et quantitative en fonction de leur itinéraire. - Secondaire 1 : La prévalence minimale de l'infertilité utérine en Limousin - Secondaire 2 : La faisabilité d'un registre régional d'infertilité utérine : temps humain, implication des professionnels de santé, accord des patientes, ...	Pr. Tristan GAUTHIER (Dr. Camille SALLEE)	Toute patiente de moins de 40 ans chez qui il sera découvert une potentielle infertilité d'origine utérine

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
NEUTROPENIE FEBRILE	Critères prédictifs de détérioration clinique et d'évolution en choc septique des patients en Neutropénie Fébrile au Service des Urgences	début : 01/04/2021 fin : 01/10/2021	L'objectif principal de l'étude est de déterminer les critères prédictifs cliniques et biologiques d'évolution vers le choc septique dans les 7 jours suivants l'admission au SU chez les patients atteints de neutropénie fébrile. Objectifs secondaires: Déterminer les critères prédictifs de bactériémie. Déterminer la proportion de patients évoluant vers le choc septique. Déterminer la proportion de patients avec une bactériémie. Déterminer la proportion de patients en sepsis. Déterminer la mortalité à J7 et J28	Dr Thomas LAFON	Patient admis au SU avec un T°> 38,3 ou 2 prise de T° > 38 à 1h d'intervalle et PNN < 0,5 G/L
VDaxial3D	Évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire droite globale et axiale par échocardiographie tridimensionnelle à la phase précoce du SDRA par SARS-CoV2.	début : 15/03/2021 fin : 01/04/2021	Objectif principal: Évaluer si les paramètres de fonction VD mesurés en échocardiographie 3D (FEVD globale et axiale) différent à la phase précoce du SDRA secondaire à SARS-CoV2 par comparaison aux autres causes de SDRA. Objectifs secondaires: Évaluer la reproductibilité de la mesure de la FEVD globale et axiale en échocardiographie 3D. Évaluer la corrélation entre la déformation systolique (strain) de la paroi libre du VD en 2D et les paramètres de la FEVD (globale et axiale) en 3D.	Dr Bruno EVRARD	Patient admis en réanimation pour SDRA ou SDRA secondaire au SARS CoV-2 ou AVC ou hémorragie méningée ou traumatisme grave et sous ventilation mécanique et ETO 3D réalisée
OBEAMP	Impact de l'Indice de la Masse Corporelle du couple sur le succès des différentes techniques d'AMP au CHU de Limoges	début : 01/03/2020 fin : 01/10/2023	Impact de l'Indice de la Masse Corporelle de l'homme et de la femme dans le projet parental	Caroline BOUILLE sous la responsabilité du Pr, Marie-Pierre TEISSIER	Couples suivis au centre de Procréation Médicalement Assisté situé à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant du CHU de Limoges à partir du 1er mars 2021
DUO TNE	Prise en charge des tumeurs neuro-endocrines duodénales entre 1 et 2 cm	début : 15/03/2021 fin : 31/10/2021	Objectif principal: Décrire le management des TNE duodénales non métastatiques, Objectifs secondaires: Décrire des facteurs prédictifs de mauvais pronostic pour les tumeurs duodénales opérées. Comparer la morbidité entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale, Comparer la qualité de l'exérèse entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale,	Margaux MEKANN BOUV-HEZ sous la responsabilité du Dr, Nikki CHRISTOU	Patients porteurs de tumeurs neuro-endocrines duodénales mesurant entre 1 et 2 cm et pris en charge par un des centres experts du Groupe d'Etude des Tumeurs Endocrines (GTE) dont le CHU de Limoges et de Bordeaux de 2009 à 2019
CIIL	Place de la coelioscopie dans la prise en charge de l'infertilité inexplicée : à propos d'une étude rétrospective au CHU de Limoges de 2005 à 2018.	début : janvier 2021 fin : décembre 2021	Impact potentiel de la coelioscopie sur la fertilité	Camille LAURENS sous la responsabilité du Dr, Lise Marie DURAND	Femmes de moins de 36 ans avec une infertilité inexplicée au bilan de première intention
COVI-C-TNC	Impact des effets du confinement COVID-19 chez les personnes suivies au CMRR du Limousin atteintes de Troubles Neurocognitifs et vivant à domicile	début : janvier 2021 fin : décembre 2021	Déterminer les effets du confinement liés au COVID-19 (17 mars à 11 mai 2020) sur les patients souffrant de TNC vivant à domicile,	Dr Leslie Cartz-Piver sous la responsabilité du Pr TCHALLA	Patient suivi au CMRR du Limousin dont la consultation prévue entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a été annulée/ reportée du fait du confinement COVID 19
REXETRIS	Effet à long terme chez le Transplanté Rénal des médicaments ImmunoSuppresseurs	début :2022 fin :2025	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer l'influence de l'immunosuppression à long terme et de son ajustement fin sur le devenir du greffon et du patient en fonction des autres facteurs de risque individuels.	Pierre MARQUET	Patients transplantés rénaux
ExpoTac	Etude des relations exposition – effets du tacrolimus (Cmax) en transplantation rénale.	début : 25/10/2021 fin : 25/10/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Explorer la relation entre la concentration maximale de tacrolimus (C _{max}) administré par voie orale et les tremblements chez des patients transplantés rénaux au cours des deux premières années post-greffe.	Pierre MARQUET	Patients transplanté rénal (>18 ans) ayant bénéficié de Tacrolimus pendant au moins deux ans,
REXETAC	Relations EXposition - Effet du TACrolimus à long terme	début :17/03/2021 fin :17/03/2023	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluation de l'influence de chacun des principaux paramètres d'exposition au tacrolimus (C _{min} , C _{max} , AUC) sur le devenir du greffon et du patient greffé rénal	Pierre MARQUET	Explorer la relation entre la concentration maximale de tacrolimus (C _{max}) administré par voie orale et les tremblements chez des patients transplantés rénaux au cours des deux premières années post-greffe.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
PhenoCov	Etude de l'intérêt de l'immunophénotypage des granuleux et des monocytes dans la prédiction de l'aggravation chez les patients infectés par le SARS-CoV-2	début :29/03/2021 fin :31/07/2021	Evaluer l'intérêt d'un phénotypage lymphocytaire et granuleux/monocytaire simple dans la préc	Jean François FAUCHER et Jean FEUILLARD	Patients adultes avec un diagnostic virologique d'infection par le SARS-CoV-2 (confirmé par un résultat PCR +) dont la prise en charge est ambulatoire après un séjour d'au moins 6 heures aux urgences,
EVAL-HEMIPASS : déjà déclarée à vérifier vieille étude	Evaluation de l'action de l'équipe mobile HEMIPASS	début :29/03/2021 fin :31/07/2021	Amélioration de la participation sociale	Maxence CAMPAGNAT sous la responsabilité du Pr Jean-christophe DAVIET	Patients ayant fait un accident vasculaire cérébrale et ayant bénéficié d'un suivi post-AVC, à domicile, par l'équipe mobile de rééducation et réadaptation à domicile du CHU de Limoges : "HEMIPASS" sur la période 2018-2020,
SaFeMèNaGeDouTra	Satisfaction des femmes sur les différentes méthodes naturelles utilisées pour la gestion de la douleur durant le travail, étude multicentrique	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer en post-partum la satisfaction des femmes sur les bienfaits des méthodes naturelles utilisées pendant le travail dans trois maternités de l'ex-Limousin (type 1, 2 et 3). OBJECTIF SECONDAIRE : Mettre en évidence les caractéristiques communes aux femmes satisfaites des méthodes naturelles.	Maëlle GUENANT (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Marie-France JAYAT	Patientes majeures ayant accouché par voie basse ou césarienne non programmée à terme d'un nouveau-né sain, à la suite d'un travail spontané ou d'un déclenchement artificiel à l'aide de prostaglandines E2.
EDLiDPraDSagesFem SurlInEtDéDuCanDuSe in	Etat des lieux des pratiques des sages-femmes sur l'information et le dépistage du cancer du sein lors du suivi gynécologique de prévention et du suivi de grossesse	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Faire un état des lieux des pratiques des sages-femmes, concernant la prévention et le dépistage du cancer du sein, en accord avec les recommandations de la HAS. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence que les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal sensibilisent les femmes aux facteurs de risques et aux facteurs protecteurs du cancer du sein lors d'une consultation gynécologique de prévention et d'un suivi de grossesse. 2- Montrer que les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal forment les femmes à l'autopalpation sénologique lors d'un suivi gynécologique de prévention et d'un suivi de grossesse. 3- Evaluer le taux de sages-femmes réalisant un examen clinique sénologique systématique en début de grossesse et lors d'un suivi gynécologique de prévention par les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal. 4- Mettre en évidence les éventuels freins des sages-femmes concernant la prévention et le dépistage du cancer du sein.	Marianne DE REYNIES (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Karine BOMPARD-GRANGER	Les sages-femmes hospitalières et libérales du Limousin, de l'Indre et du Cantal pratiquant du suivi gynécologique de prévention et réalisant le suivi de grossesse
CO PRA SA FEM LI MU SEX FEM	Connaissances et pratiques des sages-femmes de l'ancien limousin concernant les mutilations sexuelles féminines	début : Janvier 2021 fin : Mai /2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer les connaissances des sages-femmes de l'ancien Limousin concernant les mutilations sexuelles féminines et leurs complications. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence les pratiques des sages-femmes dans le diagnostic des MSF. 2- Mettre en évidence le taux de rencontre et les modalités de prise en charge des femmes victimes de MSF par les sages-femmes. 3- Mettre en évidence le rôle que les sages-femmes estiment avoir dans la prévention primaire des MSF. 4- Evaluer la satisfaction des sages-femmes concernant leur connaissances sur les MSF.	CHOMILIER Chloé (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Sophie Martinez	Sages-femmes exerçant dans les maternités publiques et privées de l'ancien Limousin dans différents secteurs (consultations - salle de naissance – suite de naissance); Sages-femmes libérales; Sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
RO RE PE FA AL MA	Rôles et ressentis des pères face à l'allaitement maternel : étude descriptive quantitative monocentrique transversale à l'aide de questionnaires	début : Janvier 2021 fin : Avril /2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Mettre en évidence les rôles pratiques du père lors de la période d'allaitement maternel OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence les différentes modalités de soutien psychologique du père envers la mère lors de la période d'allaitement maternel. 2- Secondaire 2 Mettre en évidence les ressentis du père lors de la période d'allaitement maternel.	VIGNAU Vitaline (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de BOMPARD-GRANGER Karine	Pères majeurs dont la conjointe effectue un allaitement maternel exclusif ou prédominant

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
E de la sa des a de l'Hô Mè-En de Li con les in re pen le sé en ma sur le po-par et les con de re en ur	Evaluation de la satisfaction des accouchées de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges concernant les informations reçues pendant le séjour en maternité sur le post-partum et les conseils de retour en urgence	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils de retour en urgence OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur l'allaitement maternel ou au biberon. 2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 3- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites de l'attention portée par les professionnels de santé.	Camille FRADIN (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Sarah WEHBE	Femmes majeures, parlant, lisant, écrivant le français, ayant accouché à terme à l'hôpital mère-enfant de Limoges
Com Obs et Néoz chez pri de 40 ans et plus	Les complications obstétricales et néonatales chez les primipares de 40 ans et plus : étude cas/témoins sur dossiers de 2020 à 2021	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que le taux de complications obstétricales et néonatales dans la population des primipares de 40 ans et plus est supérieur au taux de complications obstétricales et néonatales dans la population des primipares âgées de 25 ans à 39 ans, à l'HME de Limoges.	Juliette GATIPON-BACHETTE-BLANC	Patientes en primiparité, suivies et ayant accouché à l'HME de Limoges, de 40 ans et plus (cas) et entre 25 ans à 39 ans (Témoin)
Les re de la pri tar des sa-fem de l'an Li	Les représentations de la primiparité tardive des sages-femmes de l'ancien Limousin	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Mettre en évidence les représentations sociales des sages-femmes des établissements publics et privés de l'ancien Limousin concernant la primiparité tardive OBJECTIFS SECONDAIRES : 1-Montrer que les représentations de la primiparité tardive sont différentes selon les caractéristiques sociodémographiques des sages-femmes. 2- Identifier la notion d'âge seuil pour concevoir son premier enfant	ClaraGIL (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Valérie BLAIZE-GAGNERAUD	Sages-femmes diplômées d'Etat exerçant dans les secteurs public et privé de l'ancien Limousin
Cons obs con	Conséquences obstétricales à la suite conisation	début : Janvier 2021 fin : 25/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Comparer le taux d'accouchement prématuré des patientes conisées ayant accouché à l'HME avec celui de la population générale. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Comparer le taux de FCT, de RPM et de MAP des patientes conisées avec la population générale. 2 - Etudier l'existence d'un lien entre le délai « conisation – début de grossesse » et le terme de l'accouchement. 3 - Comparer la durée du travail chez une primipare conisée ayant accouché à l'HME avec la durée moyenne du travail chez les primipares non conisées dans la population générale. 4 - Comparer le taux de césariennes pour stagnation de la dilatation chez les patientes conisées et la population générale.	Marion GOUMY (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité d'Yves AUBARD	Patientes conisées ayant eu un suivi de grossesse et ayant accouché à l'HME, comparé à la population générale
Comp adapt neonat nouveau-nés	Comparaison de l'adaptation néonatale des nouveau-nés, nés par césarienne programmée ou par voie basse	début : Janvier 2021 fin : Avril 2022	Objectif Principal : Comparer l'adaptation à la vie extra-utérine des nouveaux nés à la naissance, selon qu'ils soient nés par voie basse ou par césarienne. Objectif secondaire :: Comparer cette adaptation durant les suites de naissances immédiates puis pendant le séjour en maternité	Pauline PALLIER (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Fabienne MONS	Toutes patientes ayant bénéficié de césarienne programmée à terme sur une grossesse unique sous anesthésie locorégionale, ou ayant accouché spontanément à terme.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
les com pli	Les complications de la grossesse et de l'accouchement chez les multipares âgées de 35 à 39 ans versus les multipares âgées de 18 à 34 ans, étude de dossiers de patientes prises en charge à l'Hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021	début : Janvier 2021 fin : Mai 2022	Objectif principal : Risque de pathologies gestationnelles et de l'accouchement significativement augmenté chez les multipares âgées de 35 à 39 ans par rapport à celles âgées de 18 à 34 ans.	Julie TRICOCHÉ (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Julie ROUMIGUIERES	Femmes secondipares et terciipares âgées de 35 à 39 ans (cas) et de 18 à 34 ans (témoins), ayant accouché à l'HME sur la période du 01/10/2020 au 31/08/2021.
ImpliPèGro	Implication des pères durant la grossesse corrélée à leur vision de la paternité	début : Janvier 2021 fin : 16/05/2022	Objectif principal : Rechercher si la vision de la paternité est influencée par des facteurs psychosociaux. Objectifs secondaires : 1- Rechercher un lien entre l'implication des pères au cours de la grossesse, du suivi des tâches quotidiennes et leur vision de la paternité 2- Montrer les différences entre l'implication des primipères et des multipères. Objectif principal : Détermination de la fréquence des atteintes respiratoires	Solène VERGNE (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Marie-Noëlle VOIRON	Pères majeurs, interrogés lors du 2ème jour de suite de couches
Poumon PR	Atteintes respiratoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde : état des lieux au CHU de Limoges, étude rétrospective, monocentrique.	début : avril 2021 fin : novembre 2021	Objectifs secondaires : Identification Prévalence de la toxicité médicamenteuse respiratoire	Alice LEVY sous la responsabilité de Boris Melloni et Pascale Vergne-Salle	Patient majeur porteur de polyarthrite rhumatoïde hospitalisés en Rhumatologie en 2019
Sécheresse Vaginale	Satisfaction des patientes traitées par laser pour pallier la sécheresse vaginale induite par la ménopause	début : Janvier 2021 fin : 20/06/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Déterminer au travers d'articles scientifiques l'intérêt du laser dans le traitement de la sécheresse vaginale induite par la ménopause. OBJECTIF SECONDAIRE : Définir la satisfaction des patientes suivies par un professionnel de santé qui utilise cette méthode.	Laura DAUDON (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Agnès BARAILLE	Patiente symptomatique de sécheresse vaginale induite par la ménopause, et souhaitant avoir recours au traitement par laser,
au seins acc	L'auto-palpation des seins et les accouchées, âgées de 25 ans à 45 ans, de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Réaliser un état des lieux de la pratique et des connaissances au sujet de l'autopalpation des seins des accouchées, âgées de 25 à 45 ans, à l'HME de Limoges. OBJECTIF SECONDAIRE : Montrer que les accouchées de l'HME de Limoges, âgées de 25 à 45 ans qui ont déjà réalisé l'AES, ont des caractéristiques particulières.	Jeanne DURAND (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Joelle MOLLARD	Patientes entre 25 ans et 45 ans inclus ayant accouché à l'HME de Limoges
E de la sa des a de l'Hô Mè-En de Li con les in re pen le sé en ma sur le po-par et les con de re en ur	Evaluation de la satisfaction des accouchées de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges concernant les informations reçues pendant le séjour en maternité sur le post-partum et les conseils de retour en urgence	début : Janvier 2021 fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils de retour en urgence. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur l'allaitement maternel ou au biberon. 2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 3- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites de l'attention portée par les professionnels de santé.	FRADIN Camille (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de WEHBE Sarah	Patientes majeures ayant accouché à l'hôpital mère-enfant de Limoges
FASHIONS	Etude des facteurs de risque « non médicaux » d'apparition des anticorps spécifiques du donneur ("DSA") en transplantation rénale	début : fin : 31/12/2021	Objectif principal : Identifier des facteurs psychosociaux (dits « facteurs de risque non-médicaux ») qui pourraient être associés à l'apparition de DSA en transplantation rénale.	Caroline MONCHAUD	Patients transplantés au plus tard en 2016 : patients inclus dans les cohortes EPIGREN (2007-2012) et EPHEGREN (2012-2017)
LimogesPanC	Impact de la Qualité de la prise en charge globale sur la survie des patients opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique pour tumeurs malignes;	début : 01/01/2019 fin : 09/2019	Objectif principal : Analyser l'impact de la qualité de la prise en charge globale des patients opérés d'une DPC pour tumeurs malignes sur la survie de ces malades	Evan APOURCHAUX sous la responsabilité de Niki CHRISTOU	Patients opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique pour tumeurs malignes de la région céphalique du pancréas entre 1er janvier 2010 au 31 mars 2017,
NIRS_AVC	Evaluation de l'activité corticale des aires préfrontales lors de la marche des individus AVC	début : 30/04/2021 Fin : 30/06/2021	Objectif principal : Evaluer la corrélation entre l'activité PFC et les paramètres de la marche	Maxence CAMPAGNAT	Patient avec un AVC confirmé par imagerie cérébrale

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
CCERBER	Chirurgie cardiaque et étude rétrospective des besoins d'épuration extra-rénale	début : 2021 Fin : 2022	Evaluer le recours à l'épuration extrarénale en fonction des critères d'épuration précoce ou tardives	Thèse de Olivier GUILLOT sous la responsabilité du Dr Frank PIHAN	Patient hospitalisés en réanimation de chirurgie cardiaque de janvier 2019 à Décembre 2020
CLODILIM	Evaluation des facteurs de risques favorisant la survenue d'infections à Clostridioides difficile au CHU de Limoges.	début : 04/21 fin : 04/22	Objectif principal : Evaluer les facteurs de risques des patients présentant une infection à Clostridioides difficile documentée au CHU de Limoges Objectifs secondaires : Analyser les prescriptions d'antibiotiques à risques. Evaluer la pertinence de prescription des inhibiteurs de pompe à protons (IPP) Evaluer la proportion de patients ayant une récurrence d'infection à Clostridioides difficile traitée par Fidaxomicine versus Vancomycine Per Os Evaluer la proportion d'infections nosocomiales Evaluer le coût d'hospitalisation annuel des patients hospitalisés pour une infection à Clostridioides difficile	Jean-Pascal LEBON sous la responsabilité du Pr Jean-François FAUCHER et du Dr, Nathalie GOSSE BŒUF	Tous les cas d'infections à Clostridioides difficiles (âge > 18 ans), déclarés au CHU de Limoges du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019,
ECHOPOPED	Intégration de l'échographie du poignet dans le dépistage des fractures de l'extrémité distale de l'avant-bras chez l'enfant aux urgences pédiatriques	début : 05/21 fin : 09/21	Objectif principal : déterminer la faisabilité de l'intégration de l'échoscopie diagnostique du traumatisme du poignet de l'enfant dans le parcours de soin du patient aux urgences de l'HME	R0bin GIOVARA sous la responsabilité de Pr Laurent FOURCADE	Patient de 18 mois à 16 ans, admis aux urgences de l'HME pour traumatisme fermé du poignet sans déformation clinique de Mai 2020 à Mai 2021
POCAU	Effets de la rééducation de l'équilibre sur le contrôle postural chez l'enfant atteint d'autisme	début : 01/21 fin : 06/21	Objectif principal : Comparer l'évolution du contrôle postural en simple tâche et double tâche chez des patients TSA après un programme de rééducation	Thèse de Anaïck PERROCHON sous la responsabilité du Dr Eric LEMONNIER	Enfant âgé de 5 à 14 ans qui : - a un diagnostic de TSA : confirmé par l'ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) et l'ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) en référence au DSM-V et à la CIM-10 - a bénéficié d'un protocole de rééducation de l'équilibre centre sur le travail de l'équilibre ((exercices de déstabilisation, d'équilibre et de sauts)
LIMETCCR	Effet de la metformine et des benzodiazépines sur la survie des patients atteints de cancer colorectal	début : 15/01/2021 fin : 15/06/2021	Objectif principal : Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie (globale et sans récurrences) chez des patients opérés de CCR et diabétiques	Tarhini ZEINAB sous la responsabilité du Pr Niki CHRISTOU	Les personnes âgées de plus de 18 ans étaient éligibles si elles avaient subi une chirurgie pour un CCR.
VessIRM	Evaluation prospective de l'IRM pour prédire l'envahissement musculaire des tumeurs vésicales	début : 30 Juin 2021 fin : Octobre 2021	Objectif principal : Evaluer la performance diagnostique du VI-RADS à l'IRM pour prédire de l'envahissement musculaire de la vessie.	Charlotte DOUCHEZ porteur du projet sous la responsabilité Pr Aymeric ROUCHAUD	Tout patient nécessitant une Résection Trans-Urétrale de Vessie (RTUV)
VO2_AVC	Evaluation de l'impact de l'hypersollicitation énergétique lors de la marche sur la capacité de marche et le quotidien des individus AVC	début : juin 2021 fin : Octobre 2021	Objectif Principal : Évaluer le niveau de sollicitation énergétique des individus AVC lors de la marche et son association avec les autres paramètres de la marche (spatio temporels, cinématique, musculaire). Evaluer l'impact du niveau de sollicitation énergétique lors de la marche et l'autonomie, la participation sociale et la qualité de vie des individus AVC.	Maxence COMPAGNAT	Des personnes présentant des séquelles d'AVC et capables de marcher sans aide humaine sont recrutées.
IMAGINE	Analyse dynamique de la concentration des IMMAtures Granuleux circulant comme marqueur d'infection secondaire au cours du séjour en réanimation	début : juillet 2021 fin : mars 2024	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer le lien entre le pourcentage des IG circulants et le diagnostic d'une PAVM précoce (dans les sept jours suivant l'instauration de la ventilation mécanique invasive) OBJECTIFS SECONDAIRES : 1. Evaluer le lien entre l'augmentation du nombre des IG circulant et le diagnostic d'une PAVM précoce 2. Déterminer si l'ensemble des sous-populations d'IG ont toutes des caractéristiques immunosuppressives 3. Evaluer s'il y a une corrélation entre la morphologie des granuleux immatures déterminée par cytologie et les résultats de cytométrie en flux	Dr Thomas DAIX	Personnes adultes hospitalisés depuis - de 24h en réanimation pour accident vasculaire cérébral ou hémorragie méningée, sous ventilation mécanique invasive pour critères neurologiques à l'admission en réanimation

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Rayonnements et Chirurgie Endovasculaire	Comparaison de la dose de rayon utilisé lors des procédures endovasculaires iliaques et des membres inférieurs en fonction du type d'anesthésie (anesthésie générale et rachianesthésie versus anesthésie locale et loco-régionale)	début : 19/07/2021 fin : 01/10/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : montrer la présence d'une différence de rayonnement mesuré entre le groupe anesthésie générale et rachianesthésie contre le groupe anesthésie locale et locorégionale,	Maxime GOURGUE sous la responsabilité du Dr francis PESTEIL	Patients ayant bénéficié d'une chirurgie endovasculaire à l'étage iliaque et ou des membres inférieurs (fémoral, poplité, jambier) sur la période de 2016 à 2019 inclus.
PICTURE	Pronostic de l'atteinte cardiaque droite dans le syndrome de détresse respiratoire aigüe à SARS-Cov-2	début : septembre 2021 fin : Mars 2022	<p>OBJECTIF PRINCIPAL :</p> <p>Chercher une association entre la survenue d'une atteinte ventriculaire droite identifiée par échocardiographie au cours du séjour en réanimation et la mortalité chez les patient admis pour un SDRA secondaire à une pneumopathie sévère à SARS-Cov-2.</p> <p>L'atteinte du ventricule droit est définie par la présence d'au moins un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'un coeur pulmonaire aigu défini par une dilatation ventriculaire droite associée à un septum paradoxal - Présence d'une dysfonction systolique du ventricule droit définie par une fraction d'éjection du ventricule droit (FEVD) < 45% - Présence d'une insuffisance ventriculaire droite définie par une dilatation du ventricule droit associée à une pression veineuse centrale (PVC) > 8 mmHg <p>OBJECTIFS SECONDAIRES :</p> <p>Décrire la survie en réanimation selon la présence ou non d'une atteinte ventriculaire droite (comme prédéfinie) identifiée lors de la première évaluation hémodynamique par échocardiographie réalisée dans les trois premiers jours suivant l'admission.</p>	Dr Marine GOUDELIN	Patient en réanimation atteint de syndrome de détresse respiratoire aigüe à SARS-Cov-2
EPISEPSIS URGENCES	Analyse de la prévalence, du respect des "Bundles" et du devenir des patients en Sepsis dans les Services d'Urgences du Limousin	début : Janvier 2022 fin : Juillet 2022	<p>L'objectif principal est de décrire la proportion de patients traités selon les « Bundles » de la « Surviving Sepsis Campaign », à savoir la réalisation dans les 3h suivant l'admission :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Antibiothérapie <input type="checkbox"/> Remplissage vasculaire <input type="checkbox"/> Prélèvements des hémocultures <input type="checkbox"/> Mesure de la lactatémie <p>Objectifs secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesurer la prévalence du sepsis dans les SU 2. Evaluer la prévalence des patients évoluant en choc septique 3. Comparer la prévalence du sepsis avec les SCA et les AVC 	Dr Thomas LAFON	Patient admis dans un SU de plus de 18ans et présentant un Sepsis
MAV	Évaluation des coûts de l'embolisation par voie veineuse pour le traitement endovasculaire des malformations artérioveineuses (MAV) cérébrales (MAV)	début : Décembre 2021 fin : Décembre 2022	Comparaison des coûts de prise en charge des MAV par embolisation par voie transartérielle (TAE; Technique de référence) et par voie transveineuse (TVE; Technique à l'étude)	Augustin DONJON sous la responsabilité du Pr Aymeric ROUCHAUD	Patient dont la dernière MAV a été traitée par embolisation au CHU de Limoges. Ce patient doit avoir une occlusion totale de la MAVc après ,la dernière intervention ou une occlusion partielle sans autre autre embolisation de prévue
RECOVAGEN	Recherche sur les neuropathies périphériques afin d'améliorer leur diagnostic génétique et leur compréhension physiopathologique,	début : 05/10/2021 fin : 31/12/2026	<p>Objectif principal : Découvrir de nouveaux variants pathogènes responsables de Neuropathies Périphériques,</p> <p>Objectifs secondaires : Comprendre la physiopathologie associée à ces nouveaux variants,</p>	Pauline CHAZELAS Pierre Antoine FAYE sous la responsabilité de Corinne MAGDELAINE, Frédéric FAVREAU, Franck STURTZ, Anne-Sophie LIA	Patient dont l'ADN a été analysé par le service de Biochimie et Génétique Moléculaire, associé ou non à une neuropathie du 01/01/2000 au 31/12/2026,

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
CERAMIL	Reconstruction sternale par la prothèse CERAMIL après exérèse oncologique. Etude observationnelle des 6 premières années d'implantation	début : janvier 2021 fin : Décembre 2021	Evaluer la sureté et l'efficacité de l'implantation de cette prothèse	Thèse d'Annaëlle CHERMAT Dr, François BERTIN ; Dr, Jérémy TRICARD;	Patients opérés dans le monde pour reconstruction sternale par la prothèse CERAMIL® non chargée en antibiotique après exérèse oncologique.
Spatial-ACG	Identification des acteurs moléculaires inflammatoires dans l'artérite à cellules géantes (ACG) par l'utilisation du profilage spatial in situ du transcriptome entier ou "Identifying inflammatory molecular actors in giant cell arteritis by using in situ whole transcriptome spatial profiling"	début : Juillet 2021 fin : Décembre 2021	Objectif principal : Définir de nouveaux biomarqueurs associés à l'ACG à partir des biopsies d'artères temporales (BAT), effectuées en routine, et conservées dans une collection biologique. Objectifs secondaires : 1, Caractériser le profil transcriptomique de chaque couche artérielle au cours de l'ACG, 2, Identifier un profil transcriptomique au sein de chaque couche selon le sexe des patients, 3, Identifier un profil transcriptomique au sein de chaque couche selon la sévérité de la GCA	Dr, Simon PARREAU sous la responsabilité du Dr, LY Kim	Hommes et femmes d'âge >50 ans, ayant eu une biopsie d'artère temporale pour suspicion d'artérite à cellules géantes (GCA), positive pour les malades, et négative pour les patients contrôles ,
ICTIA	Impact Clinique du Traitement Injectable lors de la phase Aiguë de la thrombose veineuse profonde (TVP)	début : 01/06/2021 fin : 01/12/2022	Objectif principal : Evaluation des pratiques de prise en charge de la TVP pendant la phase aiguë, Objectifs secondaires : 1, Comparaison de l'amélioration clinique sous traitement anticoagulant injectable et oral pendant la phase aiguë de la TVP. 2, Comparaison de la récurrence à un mois sous traitement anticoagulant injectable et oral pendant la phase aiguë de la TVP.	Dr, Ileana DESORMAIS	Patients avec une Thrombose Veineuse Profonde des membres supérieurs ou inférieurs écho-diagnostiquée dans le service de chirurgie et de médecine vasculaire du CHU de Limoges et sous traitement anticoagulant depuis moins de 48 heures.
CARBLARA	Caractéristiques des tumeurs de vessie après prise en charge d'un cancer de prostate	début : Août 2021 fin : Octobre 2021	Objectif principal : Définir si la radiothérapie a un impact sur la progression des cancers de vessie secondaire Objectifs secondaires : 1, Comparer la fréquence des variants histologiques de cancer de vessie selon l'antécédent de radiothérapie 2, Evaluer l'incidence du tabagisme selon les groupes 3, Comparer les fréquences des récurrences de cancer de vessie selon les groupes	ROUSSEAU Sybille sous la responsabilité du Pr DESCAZEAD Aurélien	2 Cohortes de patients : - Patients ayant eu un cancer de vessie entre 2005 et 2020 avec un antécédent de cancer de prostate, - Patients avec un cancer de vessie entre 2011 et 2012 chez l'homme sans antécédent de radiothérapie
ENIMS	Conséquences néonatales du Covid-19 ou État néonatal suite à une infection maternelle au SARS-CoV-2 pendant la grossesse	début : 01/02/2022 fin : 15/05/2023	Objectif principal : Faire un état des lieux de l'état néonatal suite à une infection maternelle au Sars-CoV-2 pendant la grossesse. Objectifs secondaires : Comparer l'état néonatal selon le terme de la grossesse auquel s'est déclarée l'infection au SARS-CoV-2 et selon la gravité de la maladie.	GARDEY DE SOOS Colette sous la responsabilité de VOIRON Marie-Noëlle _ Mémoire de 4ème année de SF	Femmes ayant accouchées à l'HME entre février 2021 et janvier 2022 avec un test PCR positif au Sars-CoV-2 pendant leur grossesse,
BIOPENDELTA	Le dépistage de l'hépatite delta en France métropolitaine est-il adapté ? Etude préliminaire du projet national Delta Describe	début : 01/02/2022 fin : 25/06/2022	Objectif principal : Vérifier si le dépistage de l'hépatite Delta (VHD) est fait de manière systématique chez les patients porteurs de l'antigène de surface S (AgHBs) de l'hépatite B (VHB) au CHU de Limoges. Objectifs secondaires : Décrire pour le site du CHU de Limoges les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients et le profil des prescripteurs pour tous les tests positifs sur une période de 4 ans (2017-2020). Décrire les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients testés pour le VHD et le VHB, leur répartition géographique et le profil des prescripteurs en France métropolitaine pour chaque année. Evaluer les pratiques de dépistage du VHD des principaux laboratoires régionaux de France et décrire les méthodes techniques utilisées pour le dosage de l'ARN du VHD.	BERNARDIN Myrienne sous la responsabilité du Pr, LOUSTAUD-RATTI Véronique	Patients porteurs de l'antigène de surface S (AgHBs) de l'hépatite B (VHB) au CHU de Limoges.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
PACIFIC Trial	Influence pronostique de la prise de médicaments immunosuppresseurs chez les patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique	début : 01/02/2022 fin : 01/10/2022	Objectif principal : Déterminer si l'immunodépression hors chimiothérapie est associée à une surmortalité précoce chez les patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique.	Dr Julien VAIDIE	Patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique
COMM VIL-HOP	Etude de la satisfaction des professionnels de santé sur la communication ville-hôpital dans le cadre du suivi post-opératoire des patients de chirurgie pédiatrique, pris en charge en ambulatoire à l'HME, à l'aide des outils numériques sécurisés de santé.	début : 01/08/2021 fin : 30/12/2022	Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la communication ville - hôpital Objectifs secondaires : 1, Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien 2, Evaluer 3, Evaluer l'utilisation des outils numériques l'association entre zone géographique et utilisation des outils numériques	Agnese BOVIO (interne en médecine générale) sous la responsabilité de Pr, Laurent FOURCADE	Professionnels de santé du CHU (Chirurgiens pédiatriques) et Médecins Traitants
EvEndS	Evaluation des données pronostiques des patients pris en charge pour une endocardite aigue a streptocoque au CHU de Limoges entre 2016 et 2021 en fonction des traitements antibiotiques utilisés	début : 01/01/2022 fin : 01/10/2023	Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la communication ville - hôpital Objectifs secondaires : 1, Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien 2, Evaluer 3, Evaluer l'utilisation des outils numériques l'association entre zone géographique et utilisation des outils numériques	Camille SIGNOLLET sous la responsabilité de Dr, Anne CYPierre	Patients hospitalisés au CHU entre 2016 et 2021 (inclus) traités pour une endocardite aigue à streptocoque oral ou digestif,
NADouPH-E	Noradrénaline versus phényléphrine-éphedrine : Comparaison de deux protocoles vasopresseurs dans la prévention de l'hypotension artérielle lors des césariennes sous rachianesthésie	début : 17/01/2022 fin : 30/04/2022	Objectif principal : Comparer la proportion d'hypotension artérielle systolique avant extraction fœtale dans chaque groupe Objectifs secondaires : 1, Comparer la proportion d'hypotension artérielle systolique sévère dans chaque groupe 2, Comparer la durée d'hypotension artérielle systolique dans chaque groupe 3, Comparer le nombre d'interventions médicales sur les débits et boli de vasopresseur 4, Evaluer le retentissement hémodynamique de l'hypotension artérielle dans chaque groupe 5, Evaluer la sécurité des deux protocoles de vasopresseur deux protocoles deux protocoles 6, Evaluer le bien-être fœtal des 7, Evaluer la différence de coût des	Alexandre MARTINS-BALTAR sous la responsabilité de Patrick SENGES	Césariennes sous rachianesthésie à partir du 01/03/2021 jusqu'au 31/12/2021
TélémedDG	Impact de l'outil de télémédecine MyDiabby Healthcare depuis sa mise en place en 2017 sur les complications du diabète gestationnel chez les femmes prises en charge à l'hôpital mère enfant de Limoges,	début : 03/08/2021 fin : 28/10/2021	Diminution du nombre de macrosomie, césarienne et pré-eclampsie,	BIDAN Laura _ Pr Marie-Pierre TEISSIER	Patientes avec un diabète gestationnel bénéficiant d'un suivi avec le dispositif "my Diabby" du 01/09/2017 au 31/12/2020
METCCR	Implication de la metformine dans la prévention de la cancérogénèse colorectale : action sur le couple Sortiline (NTSR3)-E Cadherin	début : 01/01/2022 fin : 31/12/2024	Comparer les taux d'expression de E cadherine et sortiline par stade tumoral et profil mutation	Dr Niki Christou	Patients avec un cancer colorectal
COVIPB	Etude bicentrique de l'impact du Covid-19 et des vaccins anti-covid-19 sur l'incidence et la gravité de la pemphigoïde bulleuse dans la région Nouvelle Aquitaine.	début : 01/02/2022 fin : 02/04/2023	Etudier l'incidence des pemphigoïdes bulleuses avant le covid19, pendant le covid19 puis lors des campagnes vaccinales	M Marco GRASSI sous la responsabilité du Pr, Philippe BERNARD	Patients présentant une pemphigoïde bulleuse diagnostiquée entre 2017 et 2021

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
FADOPO	Évaluation des facteurs personnels prédictifs de douleurs chroniques post opératoires suite à une pose de prothèse de membre inférieur de hanche et de genou.	début : 15/02/2022 fin : 30/11/2023	Objectif principal : Facteurs associés à une douleur à 3 mois (1 ère consultation de suivi post opératoire); Objectifs secondaires : 1, Facteurs associés à une douleur à 6 mois (2 ème consultation de suivi post opératoire) 2, 3, Facteurs associés à une douleur neuropathique à 3 mois Facteurs associés à une douleur neuropathique à 6 mois (2 ème consultation de suivi post opératoire) 4, 5, Fréquence de patient douloureux à 3 mois Fréquence de patient douloureux à 6 mois 6, Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 3 mois 7, Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 6 mois	Mme AKBA Saoussane (Interne en Médecine Générale) sous la responsabilité du Pr VERGNE-SALLE Pascale et Dr, ROZETTE Marc	Patients hospitalisés à partir du 1er janvier 2022 pour la pose d'une prothèse de hanche ou du genou.
Infactus et Hyperuricémie	Etude prospective sur l'incidence de l'hyperuricémie chez les patients victimes d'infarctus du myocarde : quelle est sa place dans les facteurs de risque cardio-vasculaire	début : Mai 2021 fin : Octobre 2021	Objectif principal : Déterminer l'incidence de l'hyperuricémie chez les patients présentant un infarctus du myocarde Objectifs secondaires : 2, Évaluer les facteurs de risque classiques d'infarctus du myocarde 3, Évaluer les facteurs de risques d'hyperuricémie en dehors du syndrome métabolique 4, Établir si possible un seuil d'uricémie critique	Mme BRUNOT Cécile (Interne en Médecine Générale) sous la responsabilité de Lambert De Cursay Grégoire (CH de Brive)	Patients hospitalisés dans le service de cardiologie du CH de Brive pour un Infarctus du myocarde,
S3ASP	Dépistage de l'AAA chez les sujets ayant un accident vasculaire cérébral	début : Juill 2021 fin : Octobre 2022	Evaluer la prévalence des AAA chez les sujet admis pour un accident vasculaire ischémique (transitoire ou constitué)	M RENARD Kévin (Interne) sous la responsabilité de Philippe LACROIX	Tout sujet admis pour un AVC ischémique ou un AIT
anti-HER2IPA	Impact du mode d'administration des anti-HER2 (sous cutané versus intraveineuse) sur la satisfaction des patients et externalisation à domicile notamment possible par l'infirmière de pratiques avancées.	Début : Fin : Octobre 2023	Évaluation de la satisfaction et de la qualité de vie des patients	Mme PALLARO Solène (Interne) sous la responsabilité du Dr, Elise DELUCHE et du Dr, Gaëlle MAILLAN	Patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif, traités par trastuzumab ou trastuzumab-pertuzumab, un anti-HER2) au Chu de Limoges en 2022
EFC-DTI	Evaluation des Fonctions Neurocognitives chez les patients atteints de DMLA et traités par Injections intravitréennes d'anti-VEGF.	Début : 09/06/2021 Fin : 30/09/2022	Objectif Principal : Comparer les résultats du test neurocognitif entre les différents sous groupe et déterminer si il existe une différence et surtout une détérioration des fonctions dans les groupes ayant bénéficiés de nombreuses injections. Objectif secondaire : S'assurer que les résultats sont similaires en excluant les facteurs confondants (acuité visuelle basse, facteurs de risque cardiovasculaire...)	Mme FANTINI Amandine (Interne) (sous la responsabilité du Pr, Pierre-Yves ROBERT	Patient de atteintes de DMLA Exsudative
Néphropathie, IgA et récidive	Caractéristiques cliniques des récidives précoces de néphropathie primitive à dépôts mésangiaux d'IgA après transplantation rénale	Début : Fin : 22/10/2021	Objectif Principal : Description des caractéristiques cliniques des patients ayant présenté une	Mme TOCH Chanty sous la responsabilité de Fatouma TOURE	Patients greffés pour néphropathie à dépôts d'IgA confirmée par biopsie rénale,
Tumeurs cérébrales et impact RCP	Impact de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) sur la prise en charge et la survie des patients présentant une tumeur cérébrale en situation de vraie vie	Début: 15/09/2021 Fin : 15/09/2022	Objectif principal : Evaluer le taux de concordance entre les décisions prises en RCP et la pratique courante en ce qui concerne la prise en charge des patients Objectifs secondaires : -Evaluer si l'application en pratique réelle des décisions prises en RCP modifie la survie des patients Décrire des raisons de non-application en pratique réelle des décisions prises en RCP Recueil du type de décision prise en RCP en fonction de la tumeur.	Clara Naessens interne en Oncologie médicale sous la responsabilité du Dr Elise DELUCHE	Patient dont le dossier médical a été présenté au moins une fois en RCP au début de sa prise en charge, avec une tumeur cérébrale primitive opu secondaire. Patient avec tou cancer confondu, adjuvant ou métastatique (tumeur primitive du système nerveux central, métastase cérébrale d'un autre cancer)
KT PAIN	Evaluation de l'effet de la voix de la mère sur la douleur du nouveau-né prématuré lors de la pose de catheter central épicutanéocave	Début :Juin 2020 Fin : Juin 2022	Objectif principal : Mesure des valeurs les plus élevées pour chaque enfant du score de FANS et comparaison entre le groupe « avec » et « sans » utilisation de la voix maternelle,	Audrey FLOURS, interne en pédiatrie sous la responsabilité du Dr Fabienne MONS et Dr Laure PONTHER	Nouveaux-nés de moins de 37 semaines d'aménorrhées bénéficiant de la pose d'un cathéter (voie centrale ou KTEC),

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
TAGLIM	Les tests cutanés aux héparines et apparentés chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal, consultant au service d'allergologie du CHU de Limoges entre mai 2020 et mai 2021.	Début : 01/05/2020 Fin : 04/10/2021	<p>Objectif principal : Evaluation de la proportion de patients avec des tests cutanés positifs aux héparines ou dérivés, chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal consultant au service de pneumo-allergologie du CHU de Limoges entre Mai 2020 et Mai 2021</p> <p>Objectifs secondaires : Déterminer les facteurs pouvant influencer la réactivité des tests cutanés aux héparines et dérivés, chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal consultant au service de pneumo-allergologie du CHU de Limoges entre Mai 2020 et Mai 2021, Décrire la répartition géographique des sujets allergiques selon le département de résidence.</p> <p>Proportion de sujets sensibilisés à l'alpha-gal rapportant un antécédent de piqure de tique, Proportion de sujets allergiques, rapportant un érythème local au point de morsure,</p>	Thèse de de Salomon COUMES sous la responsabilité du Dr Elisabeth BELLET	Patients sensibilisés à l'alpha-gal (>0.35 kU/L), âgés de plus de 18 ans ayant eu au moins 2 tests cutanés parmi lesquels le Fondaparinux et une prise de sang contenant au moins les IgE spécifiques alpha gal, bœuf, porc. Patient consultants au service d'allergologie entre mai 2020 et avril 2021
IAdEC	Impact d'une expertise infectiologique sur l'évolution des sujets en ischémie critique	Début : Fin : 10/2022	Objectif principal : Evaluer la diminution de la morbidité	Thèse de Ali AIT sous la responsabilité du Pr Philippe LACROIX et Dr François PESTEIL	Patient avec une Artériopathie Oblitérante des membres inférieurs(AOMI) de stade IV hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire du chu de Limoges entre 2013 et 2020 ayant bénéficié d'une amputation mineure et de la réalisation de biopsies osseuses Ce patient est déjà inclus dans une étude COPART (Influence de contrôle des principaux facteurs de risque d'athérombose sur le pronostic général du patient en ischémie permanente hospitalisé,
Intensité soin tumeurs	Indicateurs d'intensité de soins en fin de vie chez les patients traités pour une tumeur solide, une étude descriptive mono-centrique	Début : 01/11/2021 Fin : 04/2022	<p>Objectif principal : Mesurer l'intensité de soins sur le dernier mois de vie</p> <p>Objectif secondaire : Décrire la population de patients concernés Décrire le parcours de soins de prise en charge sur les derniers mois de vie</p>	Thèse de Yanis OUERK sous la responsabilité de Elise DELUCHE	Patients décédés entre le 01/06/2018 et le 01/06/2021 domiciliés à LIMOGES qui ont reçu un traitement anticancéreux intraveineux dans les 5 ans avant le décès suivi en ONCOLOGIE et UOTC pour une prise en charge d'une tumeur solide
Cancer du sein et Séquençage NGS	Oncogénétique théranostique du cancer du sein : étude des résultats de séquençage NGS de 103 patientes	Début : Fin : 11/2021	Décrire la performance diagnostic des examens réalisés	Alexandre PERANI	Femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont une indication à l'étude constitutionnelle des gènes majeurs de prédispositions aux cancers du sein et de l'ovaire
ITTEP	Incidentalomes thyroïdiens au TEP : caractéristiques et prise en charge	Début : 17/11/2020 Fin :17/11/2021	Déterminer les facteurs associés à la malignité des incidentalomes thyroïdien au TEP (Tomographie par émission de positon)	Robin MAS	Personne âgée de plus de 18 ans avec un hypermétabolisme thyroïdien au TEP-TDM qu'importe le radiotracer. Entre le 01/01/2015 et le 01/06/2021
CHORDOME	Etude biomoléculaire d'une série de chordome	Début : 01/06/2021 Fin : 01/06/2022	Description des anomalies cytogénétiques par aCGH et mise en évidence de mutation génétique par Next génération sequencing (NGS)	Henri SALLE sous la responsabilité du Pr François LABROUSSE	Tout patient opéré d'un chordome au CHU de Limoges et Hôpital LARIBOISIERE
GLIOBLASTOME et détection mutation EGFRVIII	Mise au point d'une technique de détection d'une mutation d'un récepteur membranaires (EGFRVIII) en vue de sélectionner des patients atteints d'un glioblastome pour des essais cliniques ciblant cette mutation	Début : 17/06/2020 Fin : 17/06/2021	Mise en place d'une technique Immunohistochimie	Maxence RAUTURIER sous la responsabilité du dr Karine DURAND	Patient majeur avec un glioblastome vivante ou décédé
Réparation de l'ADN et discordance entre 2 techniques	Analyse des discordances entre 2 techniques de détection de défauts dans le système de réparation de l'ADN	Début 01/06/2020 Fin : 01/06/2021	<p>Objectif principal : Développer une méthode d'analyse des résultats PCR permettant de lever la discordance observée avec l'immunohistochimie</p> <p>Objectif secondaire : Déterminer l'impact du pourcentage de cellules tumorales des échantillons sur la prévalence de cas discordants</p>	Camille GUIBERT sous la responsabilité de Karine DURAND	Patient de plus de 18 ans ayant un résultat discordant

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
MEOPA 19	Modification de l'extubation liée à la Covid 19	Début : 05/2020 Fin : 03/05/2021	Objectif principal : mesurer l'adhésion du personnel d'anesthésie aux changements de pratiques Objectifs secondaires : Evaluer l'impact de l'extubation au bloc opératoire sur le parcours patient Déterminer l'impact économique de cette pratique ressenti du personnel soignant en SSPI Evaluer le	Cédric BRABANT, Audrey GUIGNARD, Benjamin MONZIE, Nicolas MOURET, Maxime RAFFARD sous la responsabilité du Dr Elodie COUVE DEACON	Personnel du Bloc DVU, orthopédie, ORL. Patient ayant eu nune AG. Les infirmière, IADE, MAR, Interne, cadre
Taux de grossesse et deux attitudes de congélations embryonnaires	Comparaison des taux de grossesse cumulés par tentative entre 2 attitudes de congélation embryonnaire différentes au centre d' AMP du CHU de Limoges en 2018 et 2019	Début : 21/04/2020 Fin : 21/04/2022	Objectif principal : Comparer les taux de grossesse (echographie) cumulé par ponction entre les attitudes du centre d' AMP au chu de Limoges en 2018 et 2019	Camille VIALARET sous la responsabilité de Lise Marie DURAND	Tous les couples ayant eu une ponction ovarienne entre le 01/01/2018 et le 21/12/2019
Diabète et vaccination	Influence de la sensibilisation des sujets diabétiques au risque infectieux, sur l'évolution de l'état vaccinal, 3 ans après la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique	Début : 30/01/2020 Fin : 28/05/2021	Objectif principal :Etat fdes lieux de la vaccination chez le patient diabétique au sein du CHU de Limoges	Florine DESBORDES sous la responsabilité de Marie-Pierre TEISSIER	Sujets diabétiques (de plus de 18 ans) pris en charge de novembre 2018 à janvier 2020,
Cancer prostate et comparaison entre hypofractionnement et fractionnement conventionnel	Comparaison entre l'hypofractionnement et le fractionnement conventionnel dans le cancer de la prostate tous stades confondus : analyse rétrospective de la survie sans rechute biochimique, de la toxicité aiguë et tardive et de l'impact socio-économique au CHU de Limoges.	Début : 21/02/2020 Fin : 21/05/2021	Objectif principal : survie sans progression biochimique Objectifs secondaires : Survie globale Toxicité précoce et tardive Impact socio-économique	Elodie GILBERT sius la responsabilité du Pr Pierre CLAVERE	Homme avec un cancer de la prostate (tous stades confondus) prouvé histologiquement
micrositeKTC	Impact du microsite sur le nombre de ponction veineuse totale pour la pose d'un KTEC chez un nouveau-né	Rétrospective (janvier 2019-janvier 2022)	Objectif principal: Nombre de ponctions veineuses totales pour la pose de KTEC chez le nouveau-né	Hortense Miane sous la responsabilités du Dr PONTHER	Mère de nouveaux-nés hospitalisés en néonatalogie
reaVildol	impact de l'utilisation de la réalité virtuelle sur la douleur et l'anxiété médiées par le retrait des prothèses en réanimation pédiatrique	Janvier 2022 à aout 2022	Objectif principal : évaluation de la douleur secondaire au retrait de prothèses en réanimation pédiatrique (étude de pratique courante)	Domitille Lecroart sous la responsabilité du Dr Mowendabeka	Enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation pédiatrique
Diabète et Covid chez l'enfant	Impact du confinement lié au Covid sur l'équilibre du diabète de type 1 chez l'enfant	Janvier 2020 à juin 2020	Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement	Camille Fray sous la responsabilité du Dr Ponthier	Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1