



Registre public  
**des études  
sur données**  
du CHU de Limoges

2023



IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Projets enregistrés en 2020					
<b>DEPIST CIB-SYST DG</b>	Pertinence du dépistage systématique du diabète gestationnel	Début : 01/02/2020 Fin : 02/05/2020	<p>Objectif Principal : Evaluation de l'intérêt du dépistage chez les patientes sans facteur de risque,</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respect du type d'antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR</li> <li>2. Validation de l'antibioprophylaxie, ou de l'absence d'antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie,</li> <li>3. Impact sur la survenue d'une ISO</li> </ol>	Thèse de Bibi Roohi JOOMAYE encadré par le Dr TICAUD-BOILEAU Nathalie et Dr Pierre Yves AUBARD	Femmes avec un diabète gestationnel mais n'ayant pas été dépisté, ayant accouché à l'HME entre 2016 et 2018
<b>POPSUD</b>	Etude PilOte de descriPtion des taux de cicatriSation des Ulcères digitaux dans la scléroDermie systémique	Début : 02/05/2020; Fin : 02/05/2022	<p>Objectif Principal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluer le taux d'UD cicatrisés à la fin de l'étude (M12)</li> </ul> <p>Objectifs secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluer mensuellement le taux d'UD cicatrisés de M0 à M11</li> <li>- Evaluer le temps de cicatrisation de chaque ulcère, globalement et par sous-groupe (ulcère sur la main dominante / ulcère sur la main non dominante)</li> <li>- Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la douleur à M0</li> <li>- Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la fonctionnalité de la main à M0</li> <li>- Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et la différence de qualité de vie entre M0 et la visite de fin d'étude (cicatrisation complète du patient)</li> <li>- Evaluer l'association entre la fonctionnalité de la main à M0 et l'observance des protocoles de soins globale</li> <li>- Evaluer l'association entre le temps de cicatrisation et les variables suivantes : l'âge, le sexe, la durée d'évolution de la maladie, la fonctionnalité de la main à M0, l'observance globale des protocoles de soins</li> </ul>	Noemie MARCHAT	Patient (>18 ans) atteint d'une sclérodemie systémique selon les critères ACR/EULAR 2012 et présentant un ou plusieurs ulcères digitaux actifs

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>BEDSIDE 2</b>	Performance diagnostique de l'échocardiographie niveau intermédiaire réalisée par des médecins urgentistes après une formation ciblée	Début : 01/03/2021 Fin : 01/03/2022	<p>Objectif Principal :</p> Déterminer la concordance des réponses aux questions cliniques simples (binaires) concernant le/les mécanisme(s) d'une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë entre les médecins urgentistes récemment formés à l'échocardiographie niveau intermédiaire (ECMU 2) et le médecin expert utilisé comme référence chez les patients admis au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë quelle qu'en soit l'origine. <p>Objectifs Secondaires :</p> 1. Déterminer la concordance entre les propositions thérapeutiques formulées par les médecins urgentistes et par le médecin expert à partir de l'évaluation hémodynamique et pleuro-pulmonaire. 2. Déterminer la prévalence des différents profils hémodynamiques et respiratoires chez les patients admis au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou une insuffisance respiratoire aiguë. 3. Déterminer la prévalence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection VG conservée chez les patients admis au SU avec une insuffisance respiratoire aiguë. 4. Comparer les profils hémodynamiques chez les patients admis au SU avec une défaillance circulatoire aiguë selon l'origine septique ou non.	Dr Thomas LAFON	Patients admis au Service des Urgences avec des signes d'insuffisance circulatoire aiguë
<b>DIAMOND</b>	Diamètre de l'aorte abdominale sous-rénale chez la femme en population générale : dimensions moyennes et facteurs déterminants	Début : 01/02/2020 Fin : 15/10/2020	<p>Objectif Principal :</p> Déterminer des valeurs normales de diamètre de l'aorte abdominale sous rénale chez la femme Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision cutanée, Objectifs Secondaires : Déterminer les critères associés à une anomalie des mesures de l'aorte abdominale sous rénale chez la femme.	Thèse de Lucie CHASTAINGT sous la direction du Pr. Ph, LACROIX et Dr. A. ROUCHAUD	Femmes ( <sup>≥</sup> 18 ans) se présentant dans le service de radiologie pour bénéficier d'un scanner avec des coupes abdominales, quelque soit le motif de cet examen.
<b>ORTHOPED ANTIBIOTH</b>	Etude descriptive du délai entre l'administration de l'antibioprophylaxie préopératoire et l'incision cutanée en chirurgie orthopédique au CHU de Limoges	Début : 01/02/2020 Fin : 01/02/2021	<p>Objectif Principal :</p> Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision cutanée Objectifs Secondaires : 1. Respect du type d'antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR; 2. Validation de l'antibioprophylaxie, ou de l'absence d'antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie; 3. Impact sur la survenue d'une infection du site opératoire (ISO)	Etude (EPP) de Armand ALAIN encadrée par le Dr. PS MARCHEIX	Patients pris en charge en chirurgie orthopédique au CHU de Limoges pour des chirurgies "propre" ou "propre contaminée" selon les classes d'ALTEMIER. Intervention chirurgicale dite programmée.
<b>FEMUR FRACT</b>	Etude prospective observationnelle du délai de prise en charge chirurgical des fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez le sujet âgé de plus de 75 ans au CHU de Limoges avec un score "At-risk" entre 50 et 120	Début : 01/02/2020 Fin : 1/08/2021	Objectiver le taux de patients présentant une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ayant un score "At-Risk" compris entre 50 et 120 opéré à moins de 48h de leur hospitalisation.	Thèse de Armand ALAIN encadrée par le Dr. PS MARCHEIX	Sujets de plus de 75 ans avec une fracture de l'extrémité supérieure du fémur
<b>SARCOPAN</b>	Etude de la sarcopénie dans la cancer du pancréas	Début : 01/03/2020 Fin : 15/10/2021	<p>Objectif Principal :</p> Etude de la sarcopénie au moment du diagnostic de cancer du pancréas Objectifs secondaires : 1. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale sans progression, 2. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale avec récurrence, 3. Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survenue de complications de la chimiothérapie et/ou de la chirurgie, 4. Evolution de la composition corporelle, 5. Quels sont les critères de sarcopénie les plus pertinents ?	Thèse de Camille SALACROUP sous la responsabilité du Dr. Pierre JESUS	Patients (>18 ans) atteints d'un cancer du pancréas (primitif), tout stade, quelque soit le traitement

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>SPIRIHEMATO</b>	Le point-de-vue des patients atteints d'un cancer hématologique et de leurs proches concernant la spiritualité durant la phase curative initiale	Début : 16/03/2020 Fin : 30/04/2020	Décrire le point-de-vue et les besoins des patients ayant un diagnostic de cancer hématologique et de leurs proches envers la spiritualité. - Dégager les caractéristiques et les pratiques de la spiritualité rencontrées dans la pratique clinique à travers le point-de-vue des patients atteints de cancer hématologique et de leurs proches - Identifier les attentes des patients et de leurs proches concernant la spiritualité envers les différents professionnels de santé.	Jean TONIOLO	Patients (>18 ans) avec un diagnostic de cancer hématologique
<b>PIC</b>	Pressions d'orteils dans l'ischémie critique	Début : 04/02/2020; Fin : 30/10/2020	Evaluer la concordance entre la méthode sys toe et le laser doppler de la pression artérielle	Thèse de Dari LOUBNA sous la Responsabilité du Pr. Philippe LACROIX	Les personnes qui consultent ou qui sont hospitalisées pour une Artériopathie Obstructive des Membres Inférieurs (AOMI) avec suspicion d'ischémie critique (douleur ou ulcère du membre inférieur).
<b>REA-3D-VD</b>	Évaluation de la fonction ventriculaire droite par échocardiographie tridimensionnelle en réanimation.	Début : 23/04/2020 Fin : 23/04/2023	Objectif Principal : Comparer les paramètres de fonction systolique VD conventionnels (obtenus en échocardiographie 2D, en mode TM et en Doppler tissulaire) et la FEVD mesurée en ETT 3D dans une population de patients de réanimation à haut risque d'IVD.  Objectifs Secondaires : 1. Déterminer la valeur seuil des paramètres conventionnels pour identifier une dysfonction systolique VD définie par une FEVD basse (FEVD < 45%) 2. Valider l'ETO 3D pour l'évaluation quantitative de la fonction systolique VD normale et pathologique (IVD aiguë) chez le patient de réanimation ventilé sous sédation 3. Évaluer l'influence éventuelle de la cause de l'IVD aiguë (SDRA, sepsis ou choc septique, embolie pulmonaire, infarctus du VD) sur la relation entre les paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD et la FEVD mesurée en échocardiographie 3D 4. Évaluer la faisabilité et la reproductibilité de la mesure des volumes VD et de la FEVD en échocardiographie 3D, en comparaison avec celle des paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD 5. Évaluer la capacité diagnostique de l'échocardiographie 3D pour l'identification du coeur pulmonaire aigu (forme la plus sévère l'IVD) défini par une dilatation aiguë du VD (rapport des surfaces télédiastoliques VD/VG > 0,6 en grand axe) associée à un septum paradoxal en petit axe 6. Évaluer l'impact de l'IVD identifiée par échocardiographie 3D sur la mortalité, en comparaison de l'IVD identifiée par les paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD 7. Évaluer la concordance diagnostique entre la déformation systolique (strain) du VD d'une part et la dysfonction systolique du VD identifiée en échocardiographie 3D et en échocardiographie conventionnelle d'autre part.	Bruno EVRARD	Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation nécessitant une échocardiographie quelle qu'en soit l'indication et ayant une pathologie à risque d'être associée à une IVD
<b>GERICO</b>	Cohorte des patients Gériatrique de plus de 70 ans atteints de COVID 19.	Début : 17/04/2020 Fin: 17/04/2022	Objectif principal : Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients âgés atteints du COVID 19 et hospitalisés.  Objectifs secondaires : Etudier le devenir de ces patients à 6 et 12 mois. Évaluer la perte d'autonomie à 12 mois de l'infection COVID. Évaluer l'état nutritionnel pendant et à distance de l'infection. Déterminer le profil de fragilité des patients ayant été hospitalisés suite à une infection au Covid-19	Pr A. TCHALLA	Personnes âgées de 70 ans et plus atteints du COVID 19, hospitalisées depuis le début de l'épidémie dans les services dédiés à la prise en charge du COVID 19.
<b>ECHOVID URGENCES</b>	Identification des phénotypes cardiovasculaires précoces précoce par échocardiographie au Service d'Urgence chez les patients suspects d'infection à Coronavirus-19 en insuffisance respiratoire aiguë	Début : 01/06/2020 Fin : 31/12/2020	Déterminer la prévalence de l'insuffisance ventriculaire droite (IVD) et de l'insuffisance ventriculaire gauche (IVG) précoce par ETT dans une population de patients admis au SU pour insuffisance respiratoire aiguë suspectée d'être en lien avec une infection à Covid-19.	Dr A, BAISSE	Patient admis au SU pour une suspicion d'infection respiratoire à Covid-19 et présentant des signes d'insuffisances respiratoire aiguë

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>MACROGRO</b>	Maladie de Crohn et grossesse	Début: 01/11/2019 Fin : 04/2020	<p>Objectif Principal : Évaluer le taux d'accouchement prématuré chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn à l'HME de Limoges.</p> <p>Objectifs Secondaires : Étudier le déroulement de la grossesse chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn. Étudier le mode et les complications de l'accouchement chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn. Étudier l'état de santé du nouveau-né à la naissance chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn.</p>	Mémoire de LACAZE Marie sous la responsabilité du Dr GEYL Sophie et du Dr JAQCUES Jérémie	Femmes atteintes de maladie de Crohn ayant accouché ou ayant fait une fausse couche à l'HME de Limoges d'avril 2009 à avril 2019.
<b>SEDEG</b>	Syndrome d'Ehlers-Danlos et grossesse	Début : 11.2019 Fin : 03/2021	<p>Objectif Principal : Etudier la grossesse, l'accouchement et le post-partum immédiat chez des patientes atteintes du Syndrome d'Ehlers-Danlos.</p> <p>Objectif Secondaire : Observer le type de complications obstétricales retrouvées chez ces patientes.</p>	Mémoire de COMPAIN Annaëlle sous la responsabilité du Dr Cécile TIBERGHEN	<p>Patientes atteintes du syndrome d'Ehlers-Danlos de tout type, l'ayant déclaré et qu'il soit noté dans le dossier médical.</p> <p>Patientes suivies depuis le premier trimestre de la grossesse, et ayant accouché à l'HME de Limoges depuis 2009.</p> <p>Tous types de SED seront inclus dans l'étude.</p>
<b>MEDA</b>	Macrosomie et déclenchement artificiel	Début : 01/2020 Fin : 09/2020	<p>Objectif Principal : Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux de dystocie des épaules, en cas de macrosomie isolée.</p> <p>Objectifs Secondaires : Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux de lésions obstétricales du sphincter de l'anus, en cas de macrosomie isolée. Evaluer l'intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du taux d'autres morbidités néonatales (fracture de la clavicule, lésions du plexus brachial), en cas de macrosomie isolée.</p>	Mémoire de OUAB Cassandra	<p>Les patients exposés seront les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grossesse physiologique</li> <li>- Présentation céphalique</li> <li>- Mise en travail déclenchée artificiellement</li> <li>- Nouveau-né avec un poids supérieur au 90ème percentile.</li> </ul> <p>Les patients non exposés seront identiques, à l'exception que la mise en travail sera spontanée.</p>
<b>FECCo</b>	French ESD Colorectal Cohort	Début : 01/13 Fin : 12/2023	<p>Objectif Principal : Evaluer le taux de résection R0 de la dissection sous-muqueuse pour les lésions colorectales superficielles.</p> <p>Objectifs Secondaires : Evaluer le taux de récurrence endoscopique lors du premier contrôle endoscopique ; Evaluer le taux de résection monobloc, curative et optimale ; Evaluer le taux de complication à 30 jours ; Evaluer le taux de résection endoscopique curative sans prise en charge chirurgicale à 36 mois ; Evaluer le taux de chirurgie à 36 mois ; Evaluer le taux de récurrence à 36 mois ; Evaluer l'efficacité de la prédiction histologique des lésions colorectales superficielles traitées en fonction des outils technologiques utilisés</p>	Dr. Jérémie JACQUES (MCU-PH)	Tous les patients de plus de 18 ans adressés pour une dissection sous muqueuse d'un polype ou d'une LST colorectale.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Oral'idée</b>	Impact de la prise en charge de l'oralité sur le délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire.	Début :01/2013 Fin : décembre 2023	<p>Objectif Principal : Démontrer que l'acquisition de l'autonomie alimentaire est plus précoce depuis une prise en charge renforcée de l'oralité des prématurés.</p> <p>Objectifs Secondaires : Impact de la prise en charge de l'oralité renforcée sur le poids au moment de l'acquisition de l'autonomie alimentaire Evaluation du rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur la croissance Evaluation du rôle médico-économique de la prise en charge de l'oralité renforcée Evaluation du rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur les changements des habitudes d'alimentation et de nutrition artificielle</p>	Adeline BERENGER	Enfants prématurés (nés avant un délai strictement inférieur à 36 semaines d'aménorrhées),
<b>IARCUIPAG</b>	Impact de l'anémie ferriprive dans le retard de croissance intra utérin et /ou dans le petit poids pour l'âge gestationnel	Debut : 06/2020 Fin : 08/2020	<p>Objectif Principal : Montrer que l'anémie par carence martiale diagnostiquée (au 6ème mois et lors du bilan pré anesthésique) et non corrigée est retrouvée chez les patientes enceintes dont le fœtus est atteint de RCIU et/ou de PAG à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges.</p> <p>Objectifs Secondaires : Montrer que la sévérité du RCIU et/ou PAG est proportionnelle à la sévérité de l'anémie. Montrer qu'il existe une influence de la couverture sociale des patientes sur l'anémie à l'HME de Limoges. Montrer que les femmes qui présentent une anémie ferriprive ont des caractéristiques communes comme l'âge, l'IMC, la parité et un antécédent de faible poids de naissance dans la fratrie ( poids de naissance &lt; 10 ème percentile).</p>	Mémoire de Mme SISTI Morgane sous la responsabilité du Dr FIORENZA Maryse	Patientes ayant accouchées à l'hôpital mère enfant de Limoges depuis 2009 jusqu'à Août 2019 et dont l'enfant avait un poids de naissance <10ème percentile. Dans la population de l'étude toutes les femmes enceintes devront avoir eu un hémogramme lors du bilan du 6ème mois et du bilan pré anesthésique.
<b>CMOFGA</b>	Conséquences maternelles, obstétricales et fœtales de la grossesse adolescente	Début : 02/20 Fin : 10/2020	<p>Objectif Principal : mettre en évidence les pathologies touchant fréquemment les adolescentes durant la grossesse.</p> <p>Objectifs Secondaires : Observer les complications survenant fréquemment durant le travail et l'accouchement pour les futures mères adolescentes. Evaluer l'état fœtal et néonatal de ces nouveau-nés afin d'observer de probables complications. Mettre en évidence les différentes conduites à risque de ces jeunes femmes qui pourraient accroître les risques de pathologies.</p>	Mémoire de Mme PICARD Morgane sous la responsabilité de Mme BARAILLE Agnès	patientes âgées de 14 a 19 ans, nullipares, ayant eu une grossesse unique et spontanée, dont le suivi aura été régulier et ayant accouché à l'HME de Limoges
<b>COMPLodom</b>	Les complications obstétricales de l'endométriose	Début : 02/20 Fin : 09/20	<p>Réaliser un état des lieux des complications obstétricales anté et per-partum chez les femmes diagnostiquées endométriosiques à l'HME de Limoges Mettre en évidence que l'accouchement prématuré est la première complication chez les femmes endométriosiques en anté-partum de l'HME de Limoges montrer que 40% des femmes endométriosiques de l'HME de Limoges accouchent par césarienne Evaluer le taux d'hémorragie de la délivrance chez les femmes endométriosiques de l'HME de Limoges Evaluer le taux de placenta prævia en anté-partum chez les femmes endométriosiques à l'HME de Limoges</p>	Mémoire de Mme ONESIME Océane	patientes âgées de 18 à 40 ans ayant eu un diagnostic chirurgical d'endométriose, qui ont été suivies et qui ont accouchées à l'HME

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>NONELA</b>	Etat des lieux des manifestations néonatales des nouveau-nés exposés au labétalol in-utéro	Début : 11/2019 Fin : 02/2020	<p>Objectif principal : Décrire l'adaptation à la vie extra-utérine chez les nouveau-nés exposés in-utéro au labétalol.</p> <p>Objectifs secondaires : 1. Connaître la prévalence de l'hypoglycémie dans les suites de naissances chez les enfants exposés au labétalol. 2. Montrer que plus la posologie du labétalol est élevée à l'accouchement, plus les valeurs pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes. 3. Montrer que plus le traitement par labétalol est instauré précocement, plus les valeurs pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes.</p>	Mémoire de MARTIN Edith sous la responsabilité du Dr COUBRET Anne	Patiente avec traitement d'une durée minimale de 8 jours par labétalol et dont traitement encore en cours au moment de l'accouchement dont le Suivi et accouchement à l'HME de Limoges Diagnostic d'hypertension gravidique ou de pré-éclampsie établie après 20SA Monothérapie pour l'hypertension gravidique et la pré-éclampsie
<b>GROPTED</b>	Grossesse prolongée et terme dépassé : état postnatal et discussion sur le déclenchement artificiel du travail	Début :05/2020 Fin : 09/2020	<p>Objectif Principal : Montrer que les accouchements réalisés aux termes supérieurs ou égaux à 41 Semaines d'Aménorrhées (ou SA) + 6 jours n'augmentent pas significativement la morbidité néonatale mesurée par Score d'Apgar après 5 minutes de vie par rapport aux accouchements réalisés entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours.</p> <p>Objectifs Secondaires : 1. Vérifier qu'un terme d'accouchement supérieur ou égal à 41 SA + 6 jours n'augmente pas significativement le taux de césarienne et d'extraction instrumentale par rapport à un terme compris entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours. 2. Mettre en évidence que la macrosomie n'est significativement pas plus fréquente après 41 SA + 5 jours qu'entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours. 3. Montrer qu'une durée de déclenchement supérieure à 48h augmente la morbidité néonatale</p>	Mémoire de CAMPS Emma sous la responsabilité du Dr MONS Fabienne	Patientes avec grossesse monofoetale ayant accouché à partir de 41 semaines d'aménorrhées + 1 jour à l'HME de Limoges
<b>IVGCHIRGROUL</b>	IVG chirurgicales et grossesses ultérieures	Début :01/2020 Fin : 04/2020	<p>Objectif Principal : Décrire les pathologies obstétricales et néonatales de patientes ayant au moins 3 antécédents d'IVG.</p> <p>Objectifs Secondaires : 1. Montrer que 10% des patientes présentant au moins 3 antécédents d'IVG chirurgicale accouchent prématurément. 2. Montrer que la fréquence des complications obstétricales et néonatales après au moins 3 antécédents d'IVG chez les femmes de l'HME est supérieure à celle de la population générale.</p>	Mémoire de VILLEDIEU Alice sous la responsabilité de Mme TIBERGHEN Cécile	Les patientes suivies à l'HME de Limoges dès le 1er trimestre de grossesse présentant au moins 3 antécédents d'IVG chirurgicales déclarés ayant accouché à l'HME de Limoges
<b>ANTIAGE</b>	Evaluation de l'usage des ANTibiotiques au sein d'un service de Soins Aigus de GÉriatrie	Début : 01/12/2019 Fin : 31/03/2020	<p>Objectif Principal : Évaluer la pertinence de la primo-prescription de l'antibiothérapie vis-à-vis d'une étiologie donnée dans un service de soins aigus de gériatrie.</p> <p>ObjectifsSecondaires : 1. Évaluer les modalités d'administration de l'antibiothérapie dans un service de soins aigus de gériatrie. 2. Analyser l'étape de réévaluation dans un premier temps entre 24 et 72h, puis à 7j. 3. Évaluer chacun de ces critères (pertinence de la primo-prescription, modalités d'administration, réévaluation) selon le mode d'admission du patient, selon l'organisation du service (astreinte, gériatrie) et selon le type d'infection. 4. Évaluer la consommation des antibiotiques dans le service.</p>	Thèse de ROUGIER Charlotte encadré par Dr Edouard DESVAUX et Dr Jérémy JOST	Tous les patients hospitalisés dans le service de soins aigus de gériatrie du CHU de Limoges ayant reçu une primo-prescription d'antibiotique à visée curative sur germes documentés ou en probabiliste entre le 1er décembre 2019 -31 mars 2020.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Hartmann's reversal surgery</b>	Identification of risk factors for morbidity and mortality after Hartmann's reversal surgery – a retrospective study from two French centers	Début : 01/01/2010 Fin : 31/12/2015	to identify factors influencing morbidity and postoperative mortality of Hartmann's reversal.	thèse de CHRISTOU Niki encadré par le Pr MATHONNET	les patients âgés de plus de 18 ans, correspondant à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) codant HHFA014, HHFA024 et HHFC040
<b>EGAEUUC</b>	Etat des lieux de la grossesse et de l'accouchement en cas d'utérus unicatriciel	Début : Mai 2020 Fin : Septembre 2020	<p>Objectif Principal : Evaluer la proportion de complications obstétricales anté et per-partum chez les femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges.</p> <p>Objectifs Secondaires : Evaluer la proportion d'accouchement par césarienne dans la population des femmes porteuses d'utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges. Evaluer la proportion de placenta prævia dans la population des femmes porteuses d'utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges. Evaluer la proportion de rupture utérine dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges. Evaluer la proportion d'extraction instrumentale dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges. Evaluer la proportion d'hémorragie de la délivrance dans la population des femmes porteuses d'un utérus uni-catriciel à l'HME de Limoges</p>	Mémoire de DERVILLIER Maeva	Patientes porteuses d'un utérus uni-catriciel lié à une césarienne, qui ont accouché en 2019 et avec un suivi réalisé à l'HME de Limoges.
<b>Trauma Head CT Score</b>	Score prédictif de lésions post-traumatiques intracrâniennes au scanner après traumatisme crânien léger chez les patients de plus de 65 ans.	Début : juin 2020 Fin : octobre 2021	<p>Objectif Principal : Dériver et calibrer un score permettant de mieux guider l'indication de scanner crânien dans la population des patients de plus de 65 ans ayant présenté un traumatisme crânien léger.</p> <p>Objectifs Secondaires : 1. Valider le score sur une cohorte différente de validation 2. Déterminer la reproductibilité inter-observateurs de la lecture des scanners crâniens pour la détection de lésions hémorragiques post-traumatiques 3. Déterminer si la détection d'une lésion post-traumatique hémorragique est associée une intervention neurochirurgicale. 4. Déterminer la valeur du score pour prédire une intervention neurochirurgicale.</p>	Thèse de Jérémy DUPUIS encadré par le Dr ROUCHAUD Aymeric	Tout patient âgé de 65 ans ou plus, ayant présenté un traumatisme crânien léger à basse cinétique (chute de sa hauteur avec impact crânien) et pour lequel un scanner crânien a été réalisé en phase aiguë (<12 heures).
<b>PFONCOLIM</b>	Etat des lieux de la préservation de fertilité féminine dans l'indication oncologique au CHU de Limoges	Début : Mai 2020 Fin : Octobre 2020	<p>Objectif Principal : d'évaluer nos pratiques et résultats de préservation de fertilité au sein du centre d'AMP du CHU de Limoges.</p> <p>Objectifs Secondaires : Les types de cancers les plus fréquemment adressés en préservation La survie et le statut de réémission des patientes ayant bénéficié d'une préservation de fertilité la ré-utilisation des cortex et ovocytes préservés les limites de l'accès à la consultation d'oncofertilité la création d'une fiche de liaison pour les réunions de concertations pluridisciplinaires Etude observationnelle rétrospective et prospective, monocentrique</p>	mémoire de Alix TORDJMAN encadré par le Dr DURAND Lise Marie	Femme âgées de moins de 43 ans avec une pathologie ancéreuse ayant bénéficié d'une préservation de fertilité

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>IMOCOP</b>	Intérêt Médico-économique d'une d'Oxygénothérapie Ciblée sur l'Oxymétrie de Pouls (IMOCOP)	Début : 27/05/2020 Fin : fin 2020 ou début 2021	<p>Objectif Principal : Evaluer si l'utilisation d'un dispositif ajustant le débit d'oxygène à la saturation du patient permet une économie en gaz médicaux.</p> <p>Objectifs Secondaires : Evaluer la fiabilité d'une administration d'oxygène variable avec la SpO2 par rapport à une administration continue. Evaluer la sécurité d'administration d'oxygène variable selon la SpO2. Evaluer les variables conditionnant la consommation d'oxygène du patient en salle de réveil. Facteur péri-opératoire influençant la durée d'oxygénothérapie. Evaluation de la fiabilité de la machine.</p>	Thèse de AMI Pierre-Loïc encadré par Pr NATHAN-DENIZOT	Tous les patients de plus de 18 ans arrivant en SSPI qui ont reçu une oxygénothérapie avec le système FREEO2 après anesthésie générale programmée non compliquée soit avec un débit fixe (valeur de débit décidée par le médecin présent en SSPI) soit avec un débit autorégulé selon une cible de SpO2 définie selon le jugement clinique du médecin affecté à la SSPI.
<b>APALIM</b>	Utilisation de l'antibiothérapie chez le sujet âgé en fin de vie : Etude rétrospective	Début : 01/2020 Fin : 10/2020	<p>Objectif Principal : évaluer la prévalence de l'utilisation des antibiotiques dans les derniers jours de vie des patients âgés hospitalisés.</p> <p>Objectifs Secondaires : - décrire les conditions d'utilisation des antibiotiques en fin de vie (évaluer le contexte, le site infectieux, la méthode de traitement) - évaluer la décision du médecin sur la poursuite du traitement</p>	Thèse de Benjamin FESTOU encadré par le Pr TCHALLA Achille	Patients âgés de plus de 75 ans ayant été hospitalisés plus de 72 heures entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, décédé dans les services de médecine gériatrique ou de soins palliatifs ou de SSR avec une température corporelle > 38,5°C ou < 35°C dans les 10 derniers jours de vie et une infection bactérienne suspectée OU confirmée dans les 10 derniers jours de vie
<b>SePaRIC-Covid</b>	Sélection des Patients atteints de Rhumatisme Inflammatoire Chronique nécessitant une prise en charge en période de pandémie COVID-19	Début : Avril 2020 Fin : Juillet 2020	Sélection des patients nécessitant un avis auprès du Rhumatologue référent suite au questionnaire téléphonique RIC-Covid19 (par téléconsultation ou consultation présenteielle).	Pr Pascale VERGNE-SALLE	Patients atteints de RIC ayant répondu au questionnaire RIC-COVID19 lors de l'appel téléphonique mis en place le service de Rhumatologie du CHU de Limoges pendant le confinement.
<b>URO-STOM</b>	Comment les patients prennent-ils en charge leur urostomie au quotidien ?	Début : 01/20 Fin : 12/20	<p>Objectif Principal : évaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des stomies et des complications cutanées éventuelles, au sein d'une série de patients porteurs de stomies urinaires non continentales.</p> <p>Objectifs Secondaires : Identifier les paramètres associés aux complications cutanées stomiales Identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales Evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires</p>	thèse du Dr BERTHERAT Walter encadré par le Pr DESCAZEAUD Aurélien	Tous les patients porteurs de stomies urinaires non continentales définitives (stomies transiléales type Bricker ou d'urostomies) consultant dans le service d'urologie du CHU et ayant complété le questionnaire.
<b>RICOID</b>	Etude de la réponse immunitaire chez les patients COVID-19 admis en Réanimation	Début : Fin : 09/2020	<p>Objectif Principal : la covid-19 entraînent une lymphopénie globale durable</p> <p>Objectifs Secondaires : - Diminution fonctionnelle des lymphocytes - Diminution fonctionnelle des Monocytes - Corrélation entre lymphopénie et charge virale</p>	Pr Jean FEUILLARD	Patients majeurs étant admis dans le service de Médecine Intensive en Réanimation du CHU de Limoges avec un diagnostic initial de la COVID-19

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>BSS-CHIR</b>	Étude sur donnée rétrospective et prospective non-interventionnelle des modalités de prise en charge des patients opérés par une chirurgie arthroscopique de l'épaule avec un bloc interscalénique court relayé par un bloc supra-scapulaire long.	Début : 01/09/2020 Fin : 01/12/2021	<p>Objectif Principal : Évaluer l'efficacité d'un bloc interscalénique court (entre 2h et 4h) relayé par un bloc supra-scapulaire long (de 72h) sur la douleur moyenne recueillie au cours des premières 24h (J1) et sur les 2 jours en post opératoire (J2 et J3).</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluer la réadmission pour douleurs pendant la première semaine après l'opération (J1 à J7)</li> <li>- Évaluer l'apparition de pics douloureux au réveil et à la sortie du bloc le jour de l'opération</li> <li>- Évaluer la consommation d'analgésiques (morphiniques / non morphiniques) le jour de l'opération et pendant la première semaine après l'opération (J1, J2, J3, J4 et J7)</li> <li>- Évaluer la douleur des patients au temps pré-opératoire (dans le mois qui précède l'opération) et à J4, J7, J15 et J30</li> <li>- Évaluer la satisfaction du patient sur la prise en charge de la douleur à J30</li> <li>- Évaluer la survenue de complications médicales (infections, hématome, ecchymose, allergie, algodystrophie,...) à 3 mois</li> <li>- Évaluer la survenue de toxicité cartilagineuse (signes de chondrolyse gléno-humérale) à 6 mois et 12 mois.</li> </ul>	Dr Yann MARCZUK	Homme, femme entre 18 ans et 70 ans ayant eu à partir du 1 juin 2020 ou ayant besoin d'une acromioplastie ou d'une chirurgie de la coiffe des rotateurs (rupture de la coiffe ou calcification de la coiffe) ou réinsertion du bourrelet glénoïdien (intervention de Bankart)
<b>SEROCOS</b>	Analyse sérologique COVID-19 chez les patients hospitalisés au CHU pour Suspicion d'Infection COVID avec PCR négative et images TDM compatibles.	Début : 01/11/2020 Fin : 01/11/2021	<p>Objectif Principal : améliorer les performances du scanner thoracique pour le diagnostic étiologique d'une PAC virale ou apparentée, y compris COVID-19</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnostic rétrospectif sérologique des patients COVID 19 à PCR négative initiale</li> <li>- Diagnostic étiologique des autres agents pathogènes de PAC</li> <li>- Description sémiologique des scanners thoraciques</li> <li>- Présentation clinique et biologique des PAC</li> </ul>	Pr Boris MELLONI	Patient majeur hospitalisé pour un tableau COVID PCR négatif à la phase initiale (période 8 mars au 10 mai 2020),
<b>Covid-ACG</b>	Une infection à COVID19 peut-elle être responsable de la survenue d'une artérite à cellules géantes ?	Début : 10/2020 Fin : 02/2021	<p>Objectif Principal : Evaluer la positivité de la PCR SARS-CoV-2 sur les biopsies d'artère temporale (BAT) de patient suspect de GCA</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluer la positivité de la sérologie SARS-CoV-2 dans le sérum des patients atteints de GCA selon les critères de l'ACR</li> <li>- Comparer l'expression de CXCL10 et CXCR3 par RT-PCR quantitative au niveau des BAT de patients suspects de GCA en fonction de leur statut Covid-19</li> </ul>	Dr Kim LY Dr Eric LIOZON	Hommes et femmes d'âge >50 ans ayant eu une BAT pour suspicion d'artérite à cellules géantes (GCA), entre Novembre 2019 et Juillet 2020
<b>COPACOV</b>	COhorte des Patients Adultes de moins 70 ans atteints du COVID19	Début : 05/2020 fin : 11/2021	<p>Objectif principal :</p> <p>Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients hospitalisés atteints du COVID 19 de moins de 70 ans</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <p>Étudier le devenir de ces patients à 6 et 12 mois</p> <p>Evaluer le nombre d'évènements indésirables depuis le diagnostic</p>	Dr LY Kim	Patient de moins de 70 ans ayant été diagnostiqué COVID 19 positif par RT-PCR et/ou scanner thoracique et hospitalisé dans un service COVID entre le début de la pandémie et le 11 mai 2020
<b>CEEKIT</b>	Apport de l'échographie de contraste à 3 mois dans la stratégie de prise en charge des sujets transplantés rénaux : étude pilote	Début : 12/2020 Fin:10/2021	<p>Objectif principal :</p> <p>Décrire les paramètres échographiques avec analyse de contraste au 3eme mois de la greffe rénale.</p> <p>Objectifs secondaires :</p> <p>Etudier la corrélation entre les données de l'échographie de contraste, les données biologiques et cliniques.</p>	Pr Philippe LACROIX	Patients majeurs âgés d'au moins 18 ans ayant consenti et greffés rénaux à 3 mois post transplantation

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>uPA-SEIN</b>	Etude rétrospective de l'impact d'uPA/PAI-1 et PAM 50 dans la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein.	Début : mai 2020 fin : octobre 2020	<p>Objectif principal : Comparer l'impact de PAM50 et/ou de l'uPA/PAI-1 sur les décisions de chimiothérapie</p> <p>Objectif secondaire : 1. Evaluer les caractéristiques clinico-pathologiques dans chacun des groupes à risque de récurrence selon uPA/PAI-1 seul, PAM50 seul et uPA/PAI-1 et PAM50 combinés 2. Evaluer la Survie sans maladie invasive à distance (iDFS) 3. Evaluer la survie globale (SG)</p>	Thèse de SANCHEZ Raphael encadré par le Dr DELUCHE Elise	Patientes âgées de plus de 18 ans porteuses d'un cancer du sein infiltrant localisé sans atteinte ganglionnaire, pris en charge au CHU de LIMOGES entre janvier 2010 et décembre 2019 inclus et ayant bénéficié soit d'une analyse d'uPA/PAI1 soit de PAM 50.
<b>DECIMALE</b>	Comparaison du DEbit Cardlaque mesuré par échocardiographie et par therModilution trAnspulmonaire chez les patients présentant une insuffisance circuloLatoire aigue	Début : Décembre 2020 Fin: Décembre 2023	<p>Objectif principal : Comparer les valeurs de débit cardiaque mesuré par échocardiographie doppler et par thermodilution transpulmonaire (PICCO2) chez les patients de réanimation admis pour insuffisance circulatoire aiguë sous ventilation mécanique, en situation basale et au décours d'interventions thérapeutiques à visée hémodynamique.</p> <p>Objectif secondaire : 1. Etudier la concordance des variations du débit cardiaque mesurées par les deux approches en fonction du type de modification thérapeutique instaurée (remplissage vasculaire, inotropes positifs, vasopresseurs). 2. Comparer les variations de volume ventriculaire gauche mesurées en échocardiographie 3D et en imagerie bidimensionnelle standard au décours d'interventions thérapeutiques à visée hémodynamique. 3. Evaluer l'influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur du strain longitudinal global du ventricule gauche et du strain de la paroi libre du ventricule droit 4. Evaluer l'influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur de la vitesse maximale de raccourcissement systolique et d'élongation diastolique des fibres myocardiques longitudinales du ventricule gauche mesurées en doppler tissulaire à l'anneau mitral lorsqu'une échocardiographie transthoracique (ETT) et transoesophagienne (ETO) sont réalisées successivement (ex: ETT devant être complétée par une ETO dont la capacité diagnostique est supérieure chez le patient ventilé).</p>	Dr Marine GOUDELIN	Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation pour une insuffisance circulatoire aiguë
<b>Radio-axios</b>	Drainage sous-echoendoscopie avec prothèse d'apposition vs drainage radiologique en cas d'obstacle biliaire tumorale distal et d'échec de CPRE, étude rétrospective	Début : 05/2020 Fin: 10/2020	<p>Objectif principal : comparaison du succès clinique à un mois du drainage des voies biliaires par voie radiologique ou échoendoscopique.</p> <p>Objectif secondaire : 1. comparaison du taux de complications post geste précoces 2. comparaison des taux de survenue d'obstruction de la prothèse biliaire 3. comparaison de la survie globale 4. une comparaison médico économique des deux stratégies au cours du temps du point de vue de la sécurité sociale</p>	Dr Jérémie JACQUES	Patients souffrant d'un cancer du pancréas et décédés au moment du recueil des données

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>EchoVID REA</b>	Phénotypes cardiovasculaires et respiratoires au cours du syndrome de détresse respiratoire aigu lié au COVID-19 : lien étiopathogénique et pronostique	Début : Décembre 2020 Fin : 01/12/2023	<p>Objectif principal :</p> <p>Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire identifié en échocardiographie (notamment la présence d'un CPA) et le phénotype respiratoire (type et sévérité du SDRA) chez les patients hospitalisés en réanimation pour une pneumopathie sévère liée au COVID-19.</p> <p>Objectif secondaire :</p> <p>1. Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire et respiratoire d'une part, et le pronostic d'autre part 2. Comparer la prévalence du CPA (sévère ou non) et de la dysfonction VG au cours du SDRA lié à l'épidémie de COVID-19 et au virus de la grippe sur la saison 2019-2020.</p>	Pr Philippe VIGNON	Patient majeur admis en réanimation pour une pneumopathie à COVID-19 en 2020
<b>OESO-SARCOPENIA</b>	Impact de la composition corporelle sur le devenir des patients porteur d'un cancer de l'œsophage.	Début : Mai 2020 Fin : Octobre 2020	<p>Objectif principal :</p> <p>Evaluer le lien entre la survie sans progression (SSP) et la composition corporelle initiale (dont la sarcopénie) évaluée au diagnostic,</p> <p>Objectif secondaire :</p> <p>1. Evaluer l'évolution de la composition corporelle entre le diagnostic initial et la récurrence 2. Evaluer par intelligence artificielle, l'impact pronostique de la sarcopénie au diagnostic initial et à la récurrence 3. Evaluer le lien entre la survie globale et la composition corporelle initiale. 4. Evaluer les complications post-opératoires en fonction de la composition corporelle initiale, si chirurgie.</p>	thèse du Yacine ZOUHRY encadré par le Dr DELUCHE Elise	Patients atteints d'un cancer de l'œsophage non métastatique et pris en charge par chimiothérapie et/ou radiothérapie entre janvier 2009 et mars 2020
<b>PULSION</b>	Description d'un nouveau signe échocardiographique dans l'insuffisance aortique aiguë : l'hyperpulsatilité de l'aorte thoracique descendante.	Début : Décembre 2020 Fin : Décembre 2022	<p>L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'intérêt d'un indice d'hyperpulsatilité de l'aorte thoracique descendante en ETO dans l'insuffisance aortique aiguë.</p> <p>L'objectif secondaire est l'évaluation de la reproductibilité inter- et intra-observateur de la mesure.</p>	Dr Marine GOUDELIN	<p>Nous sélectionnerons les patients présentant, sur l'ETO, une IA moyenne ou importante (grade 3/4 ou 4/4) secondaire à une endocardite infectieuse aiguë sur valve native définie par les critères de Duke</p> <p>Les témoins seront des patients pris en charge en Réanimation Polyvalente pendant la même période et qui auront bénéficié d'une ETO pour un autre motif.</p>
<b>DESTINEE</b>	Mesure de la déformation longitudinale globale du ventricule gauche en échocardiographie transoesophagienne chez les patients ventilés en choc septique	Début : Décembre 2020 Fin : Décembre 2022	<p>L'objectif principal est d'évaluer la faisabilité du SLG du VG en ETO chez les patients en choc septique sous ventilation mécanique.</p> <p>Les objectifs secondaires comportent la reproductibilité inter- et intra-observateur de la technique, la relation entre le SLG VG et la FEVG et la relation entre le SLG du VG et la mortalité en Réanimation.</p>	Dr Marine GOUDELIN	Patient adulte hospitalisé en Réanimation pour choc septique entre janvier 2010 et décembre 2020 selon la définition Sepsis-3 et ayant bénéficié d'une ETO avec coupe des quatre cavités de qualité adéquate pour une analyse par speckle tracking dans les trois jours suivant l'admission
<b>ACHROSS</b>	ACHROMobacter Système Sécrétoire	Début : Septembre 2020 Fin : janvier 2022	Création d'une collection biologique de souches d'Achromobacter Xyloosidans (Ax ; de réservoir inconnu et résistantes aux antibiotiques) et de prélèvements d'expectorations (spontanée ou induite), chez des patients atteints et non atteints de Mucoviscidose, dans la perspective de mettre en évidence une corrélation entre la présence de cette souche bactérienne Ax et la démonstration expérimentale de l'activité de leur système d'antagonisme (une nanomachine de sécrétion de type VI (T6SS),	Dr Fabien GARNIER	Patients atteints et non atteints de Mucoviscidose
<b>BIOSUPPORT</b>	Optimisation de la survie à long terme en transplantation d'organes : de la physiopathologie à la prise en charge optimisée des patients	Début : Décembre 2020 Fin : Décembre 2023	Création d'une collection biologique afin d'étudier les facteurs influençant la survie du greffon à long terme chez les patients receveurs de rein, de foie, ou de cœur au sein de la FHU	Pr, Sophie ALAIN	Patients transplantés du rein, du foie ou de cœur

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>MACROGOS</b>	Etude du bénéfice du déclenchement pour macrosomie foetale à propos d'une étude rétrospective d'une série de 550 cas.	Début : Janvier 2020 Fin : Décembre 2020	Comparaison du taux d'accouchement par voie basse (AVB) chez les patientes déclenchées versus non déclenchées selon le "protocole macrosomie" à l'étude. - Évaluation morbi-mortalité maternelle. - Évaluation morbi-mortalité foetale.	Thèse de Manon BAUDRY sous la responsabilité du Dr Perrine COSTE MAZEAU	Patientes ayant été déclenchées pour macrosomie selon le "protocole à l'étude" et patientes ayant accouché d'un enfant macrosome, dans le service de gynécologie du Chu de Limoges, sur la période de septembre 2016 à décembre 2020,
<b>MEDCCR</b>	Medullary colonic carcinoma	Début : Mars 2020 Fin : Décembre 2020	Démontrer que le cancer médullaire colorectal est un type de cancer avec un pronostic à part entière probablement différent de l'entité histologique la plus fréquente à savoir l'adénocarcinome colorectal. Cohorte rétrospective, descriptive de 10 cas d'adénocarcinomes coliques de type médullaires, cas rares, ayant été opérés entre 2000 et 2020 au CHU de Limoges. Analyse en sous groupes à la recherche de facteurs pronostiques. Comparaison Mise en regard des données de notre cohorte avec celles de la littérature.	Thèse de Léa VEYRUNE sous la responsabilité du Pr Nikki CHRISTOU	Diagnostic anatomopathologique d'adénocarcinome colorectal de type médullaire entre 2000 et 2020 ,
<b>CMF_MW</b>	Etude rétrospective de l'intérêt du double immunophénotypage lymphocytaire et plasmocytaire pour le diagnostic de la macroglobulinémie de Waldenström (MW).	Début : Janvier 2020 Fin : Février 2020	Objectif Principal : Evaluer la sensibilité et la spécificité du double immunophénotypage pour le diagnostic de MW  Objectifs secondaires : 1, Optimiser la méthode d'analyse des données d'immunophénotypage des lymphocytes et des plasmocytes pour le diagnostic de MW 2, Etudier les associations / corrélations éventuelles avec les autres paramètres clinico-biologiques (intensité de la différenciation plasmocytaire, quantité d'IgM monoclonale sécrétée, ...)	Dr, David RIZZO sous la responsabilité du Pr. Jean FEUILLARD	Patientes atteints d'une macroglobulinémie de Waldenström (MW : syndrome lymphoprolifératif rare) avec une prise en charge initiale dans le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire depuis 2012.
<b>MigrCancerScreening 87-19</b>	Analyse épidémiologique du dépistage du cancer colorectal en France parmi les patients avec un historique migratoire	Début : Octobre 2020 Fin : Octobre 2021	Evaluer les taux de participation au dépistage du cancer colorectal des patients d'origine étrangère versus ceux nés en France , Evaluer la distribution régionale des patients d'origine étrangère ayant bénéficié de la campagne de dépistage du cancer colorectal sur deux ans en fonction de leur pays d'origine , Evaluer les taux de réalisation de la coloscopie en cas de positivité, ainsi que les résultats anapath de celles-ci.	Dr, Nikki CHRISTOU	Patientes âgés de 50 à 74 ans orientés vers les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC)
<b>URGEO</b>	Hyperéosinophilie au service des urgences : étude épidémiologique descriptive	Début : Décembre 2020 Fin : Juin 2021	Objectif Principal : Déterminer la prévalence de l'hyperéosinophilie (supérieure à 1.5 G/L) sur une cohorte de patients admis au service des urgences du CHU de Limoges, Objectif(s) secondaires: 1, Déterminer quel que soit le motif d'admission les caractéristiques cliniques, anamnestiques, démographiques et biologiques précoces associées à une hyperéosinophilie. 2, Déterminer la survie à 3 mois des patients étudiés. 3, Déterminer des facteurs cliniques et/ou biologiques prédictifs de mortalité à 3 mois	Dr, Arthur BAISSÉ sous la responsabilité du Dr, Simon PARREAU	Tous les patients admis au service des urgences du CHU de Limoges pendant la période d'étude s'étalant de Janvier 2013 à Décembre 2018 et présentant une hyperéosinophilie (Age >18 ans),
<b>DOC COVID 19</b>	Données Clinico biologique des patients hospitalisés en service de médecine atteint du COVID 19 au CHU de Limoges.	Début : 05/2020 Fin : 11/2021	Réaliser le descriptif des patients COVID + hospitalisés dans les services cliniques du CHU de Limoges Déterminer les facteurs prédictifs de mortalité et de délai de survie	Dr, Edouard DESVAUX	Étude de cohorte rétrospective au CHU de Limoges dans les services de médecine aiguë (maladies infectieuses et tropicales, polyclinique, unité COVID) ayant reçu des patients hospitalisés pour une infection à COVID 19. Patient hospitalisé dans un service de médecine au CHU de Limoges (MIT, polyclinique, unité COVID)

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Uro-Stom	Comment les patients prennent-ils en charge leur urostomie au quotidien ?	Début :06/2020 Fin : 06/2021	Objectif principal : Evaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des stomies et des complications cutanées éventuelles, au sein d'une série de patients porteurs de stomies urinaires non continentes. Objectifs secondaires : Identifier les paramètres associés aux complications cutanées stomiales, Identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales, Evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires,	Thèse de Walter BERTHERAT sous la responsabilité du Pr, Aurélien DESCAZEAUD	Patients porteurs de stomies urinaires définitives suivis dans le service d'urologie du CHU de Limoges depuis le mois de janvier 2020,
PODIMPACT	Impact d'un protocole de service sur l'accouchement par voie basse des présentations du siège à terme. Etude rétrospective de cohorte au CHU de Limoges de janvier 2009 à septembre 2010	Début :14/12/2020 Fin : 30/06/2021	Objectif principal : Décrire la prise en charge de la présentation du siège à terme au CHU de Limoges depuis 2009 afin d'évaluer si la mise en place d'un protocole de service en 2015 a permis l'augmentation de la pratique de l'accouchement par voie basse des présentations du siège et si, parmi les patientes pour laquelle il est prévu une intention d'accouchement par voie basse, le taux de réussite de cette dernière a été amélioré. Objectifs secondaires : Comparer l'état néonatal des enfants entre les groupes intentions d'accouchement par voie naturelle à terme et intentions de césarienne à terme, Rechercher d'éventuels facteurs de risque d'échec à la voie basse.	Robin AMAURY sous la responsabilité de Perrine COSTE MAZEAU	Naissances en présentation du siège; Terme de naissance supérieur ou égal à 37 semaines d'aménorrhées; Grossesse monofoetale, au cours de la période : du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2020 à l'HME du CHU de Limoges,
DIABCRC	L'effet de la metformine sur la survie après chirurgie pour cancer colorectal chez les patients atteints de diabète sucré de type 2	Début :28/12/2020 Fin :30/06/2021	Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie globale Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie sans récurrences de la maladie [CCR]	Zeinab TARHINI (M2 Santé Publique) sous la responsabilité du Dr Niki CHRISTOU	Patients admis au sein du service de Chirurgie Digestive ayant bénéficiés d'une chirurgie pour Cancer Colorectal de 2017 à 2020
PERMACOL	La CRP post-opératoire est-elle un facteur prédictif de complications chez les patients opérés d'une cure d'événtration avec prothèse biologique ?	Début : 08/2020 Fin :01/2021	Objectif principal : Evaluer le lien entre le taux de la CRP post-opératoire et les complications postopératoires chez les patients opérés d'une cure d'événtration avec prothèse biologique,	Abdelkader TAIBI	Tous les patients opérés d'une cure d'événtration avec mise en place d'une bioprothèse,
COCOA	Cohorte de patients COVID suivis en ambulatoire en Limousin	Début : Avril 2020 Fin : décembre 2021	Décrire chez les patients infectés par le Covid 19 en Médecine Générale les signes cliniques en termes de prévalence et d'incidence, de durée d'évolution, de mode d'évolution en fonction de la présence ou non de comorbidités et d'incidence des complications. Evaluer le vécu psychologique Confronter les résultats à ceux recueillis en milieu hospitalier afin d'améliorer nos connaissances sur cette infection et nos compétences pour la gérer.	Adeline BERTRAND sous la responsabilité de Karen RUDELLE et Nathalie DUMOITIER	Inclusion des patients suspects atteints de la Covid 19, depuis avril 2020, par le centre 15 de Limoges et par les médecins généralistes des 3 départements du Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), puis le Centre 15 Guéret et maintenant l'ensemble des médecins du GHT Limousin.
INFORDIG	Evaluation de l'INFORMATION Retenue par les patients en consultation préopératoire et son impact sur l'anxiété avant une chirurgie Digestive, générale et endocrinienne programmée.	Début : 27/06/2020 Fin :26/10/2020	Objectif Principal : Déterminer si renouveler l'information préopératoire une semaine avant l'intervention, en se basant sur la « fiche Information préopératoire » de la FCVD, augmente l'assimilation de l'information en chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne. Objectifs secondaires : 1, Evaluer la veille ou le jour de l'intervention l'anxiété préopératoire selon deux échelles (APAIS et EVA-A). 2, Evaluer la veille ou le jour de l'intervention le besoin d'information selon l'échelle APAIS 3, Evaluer la veille ou le jour de l'intervention le retentissement de l'anxiété sur l'hémodynamisme préopératoire (Pression artérielle et fréquence cardiaque).	Celia BOUNIF sous la responsabilité du Pr. Muriel MATHONNET	Patient devant bénéficier d'une chirurgie sous anesthésie générale en chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne patients âgés de plus de 18 ans
ENEWBORN	Durée d'hospitalisations chez les enfants nés à moins de 32 SA	Début : octobre 2019 Fin ; octobre 2020	Comparaison des durées d'hospitalisation entre les enfants sortant directement du niveau 3 et les enfants retournant vers un niveau 2a ou 2b avant leur sortie à domicile	AL Blanquart sous la responsabilité du Dr PONTHER	Enfants nés à moins de 32 Semaines d'Aménorrhée

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Vancoprem</b>	Assessment of Bayesian model for Vancomycin regimen treatment in neonates.	Début : octobre 2017 Fin : octobre 2018	Objectif Principal : Vérifier la validité du modèle Bayésien, développé en pharmacologie (prenant en compte l'âge actuel, le poids actuel, la créatininémie et le taux de vancocinémie H48 du début du traitement antibiotique), dans l'adaptation thérapeutique pour l'atteinte des taux de vancocinémie cibles de 15 à 25mg/L.	Pauline Ensuque sous la responsabilité Dr L PONTHER	Nouveau né à terme ou prématuré bénéficiant d'un traitement par vancomycine
<b>SteptoB</b>	Modification de la surveillance en maternité des nouveau-nés à risque d'infection néonatale bactérienne précoce avec la PCR streptoB	Début : décembre 2019 Fin : Novembre 2020	L'objectif principal de cette étude est d'évaluer si la réalisation de la PCR en per partum modifie la surveillance en maternité des nouveau-nés à risque d'infection néonatale bactérienne précoce. Les objectifs secondaires de cette étude sont d'observer l'impact de la PCR sur l'antibiothérapie per partum et d'évaluer la faisabilité de la réalisation de la PCR par les sages-femmes en salle de naissance.	AL Blanquart sous la responsabilité du Dr PONTHER	Nouveau-nés dont la mère a bénéficié d'une PCR SreptoB
	Evaluation par l'échelle d'Edimbourg du risque de dépression du post partum chez les mères d'enfants hospitalisés en néonatalogie.	Début : Avril 2020 à avril 2021	Evaluation chiffrée de l'état psychologique des mères d'enfants hospitalisés en néonatalogie (étude de pratique courante)	L Douziech sous la responsabilité du Dr Mons Fabienne	Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie
<b>Oral'idée</b>	Impact du renforcement de la prise en charge de l'oralité sur le délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire	Rétrospective (grpe avant nov 2012-05/2013 et grpe après nov 2017 mai 2018)	Objectif principal : comparaison du délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire avant/après prise en charge renforcée de l'oralité. Objectifs secondaires : comparaison des durées des différentes nutritons assistées, des durées d'hospitalisation, de l'allaitement maternel et des paramètres de croissance entre les deux groupes	A Berenger sous la responsabilité du Dr Mons Fabienne	Nouveau-né prématurés sortis à domicile des unités de néonatalogie sur les périodes d'intérêt
<b>micrositeKTC</b>	Impact du microsite sur le nombre de ponction veineuse totale pour la pose d'un KTEC chez un nouveau-né	Rétrospective (janvier 2019-janvier 2022)	Objectif principal: Nombre de ponctions veineuses totales pour la pose de KTEC chez le nouveau-né	Hortense Miane sous la responsabilité du Dr PONTHER	Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie
	Impact du confinement lié au Covid sur l'équilibre du diabète de type 1 chez l'enfant	janvier 2020 à juin 2020	Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement	Camille Fray sous la responsabilité du Dr Ponthier	Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1
<b>Fracture du plancher orbitaire et motricité oculaire</b>	Étude de la relation entre la présentation scanographique d'une fracture du plancher orbitaire, les anomalies de la motricité oculaire et la nécessité d'une reconstruction chirurgicale.	Début : 01/06/2020 Fin : 01/10/2021	Chercher la relation entre la survenue d'une diplopie verticale lors d'une fracture du plancher de l'orbite de type "blow out" isolée et une mesure scanographique simple et reproductible,	Esther PAGES sous la responsabilité du Dr, Joël BRIE	Patients adressés en consultation en chirurgie maxillo-faciale pour une fracture du plancher orbitaire (type « blow out») isolée.
<b>INSPIRE</b>	Suivi de la colonisation respiratoire des patients intubés	Début : Fev 2020 Fin : Fév 2022	Principaux > Etudier la dynamique évolutive des sécrétions endotrachéales en termes de volume, coloration et microbiote au cours de la ventilation mécanique invasive ; et leur corrélation avec le score CPIS Secondaires > Analyser la relation entre les variations clinico-microbiologiques retrouvées et la survenue d'évènements infectieux (pneumopathie acquise sous ventilation mécanique précoce, trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique)	Dr Estelle DANCHE	Les sujets seront des patients admis dans le service de Réanimation Polyvalente du CHU de Limoges.
<b>IVACOV</b>	Intention de Vaccination au COronaVirus chez les soignants	Début : sept 2020 Fin : sept 2021	Objectif principal : Identifier les facteurs de frein à la vaccination Objectif secondaire : Comparer l'intention de vaccination à la grippe à celle pour le coronavirus 2019 Comparer l'intention vaccinale selon la fonction hospitalière (Médecin / Infirmières) et selon le rôle du service (service COVID/service non COVID),	Dr David VANDROUX	Soignants médicaux et paramédicaux en poste stable (> 3mois) des services suivants: réanimation cardiothoracique, réanimation polyvalente, maladies infectieuses, chirurgie cardiaque
Projets enregistrées en 2021					
<b>reaVildol</b>	impact de l'utilisation de la réalité virtuelle sur la douleur et l'anxiété médiées par le retrait des prothèses en réanimation pédiatrique	Début : janvier 2022 Fin : aout 2022	objectif principal : évaluation de la douleur secondaire au retrait de prothèses en réanimation pédiatrique (étude de pratique courante)	Domitille Lacroart sous la responsabilité du Dr Mowendabeka	enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation pédiatrique

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>COSINUS</b>	Facteurs pronostiques des sinusites aiguës compliquées de l'enfant : étude rétrospective de 2010 à 2020 au CHU de Limoges	Début : Décembre 2020 Fin : février 2021	Objectif Principal : Recherche de facteur de risque de complication chez les enfants hospitalisés pour RA Objectifs secondaires : 1, Facteurs associés avec la nécessité d'un traitement chirurgical ou l'échec d'un traitement médico-chirurgical bien conduit 2, Mettre en évidence une augmentation dans le temps des complications intra-craniennes et tenter de l'expliquer 3, Proposer de nouveaux critères amenant à suspecter une RA compliquée chez un patient consultant aux urgences	Lucie CUSSINET sous la responsabilité du Pr, Karine AUBRY	Patients âgés de moins de 18 ans, hospitalisés pour rhinosinusite aiguë, du 1/1/10 au 31/12/20,
<b>PERIFILL</b>	Evaluation de l'efficacité et de l'inocuité du lipofilling périnéal en cas de douleur post accouchement	Début : Février 2021 Fin : Juin 2021	Objectif principal : Evaluation de la douleur et la recherche de complications Objectifs secondaires : 1, Rechercher une amélioration globale de la qualité de vie à 3 mois, 6 mois, 1 an 2, Rechercher une amélioration du bien être sexuel 3, Rechercher amélioration de l'incontinence	Thèse de BEN RHAJEM Sami sous la responsabilité du Dr Hugues CALY	Patientes avec une grossesse monofoetale ayant bénéficié d'un lipofilling périnéal ayant accouchées à l'HME du CHU de Limoges,
<b>Infertilité Utérine</b>	Étude pilote territoriale sur la prévalence et l'itinéraire thérapeutique des patientes présentant une infertilité utérine	Début : Fév. 2021 - Mai 2021	- Principal : Compréhension du comportement des patientes ayant une infertilité utérine en ce qui concerne leur parcours de soins. L'approche sera à la fois qualitative avec la description de l'itinéraire thérapeutique des patientes et le détail de leur prise en charge, et quantitative en fonction de leur itinéraire. - Secondaire 1 : La prévalence minimale de l'infertilité utérine en Limousin - Secondaire 2 : La faisabilité d'un registre régional d'infertilité utérine : temps humain, implication des professionnels de santé, accord des patientes, ...	Pr. Tristan GAUTHIER (Dr. Camille SALLEE)	Toute patiente de moins de 40 ans chez qui il sera découvert une potentielle infertilité d'origine utérine
<b>NEUTROPENIE FEBRILE</b>	Critères prédictifs de détérioration clinique et d'évolution en choc septique des patients en Neutropénie Fébrile au Service des Urgences	Début : 01/04/2021 Fin : 01/10/2021	L'objectif principal de l'étude est de déterminer les critères prédictifs cliniques et biologiques d'évolution vers le choc septique dans les 7 jours suivants l'admission au SU chez les patients atteints de neutropénie fébrile. Objectifs secondaires: Déterminer les critères prédictifs de bactériémie. Déterminer la proportion de patients évoluant vers le choc septique. Déterminer la proportion de patients avec une bactériémie. Déterminer la proportion de patients en sepsis. Déterminer la mortalité à J7 et J28	Dr Thomas LAFON	Patient admis au SU avec un T° > 38,3 ou 2 prise de T° > 38 à 1h d'intervalle et PNN < 0,5 G/L
<b>VDaxial3D</b>	Évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire droite globale et axiale par échocardiographie tridimensionnelle à la phase précoce du SDRA par SARS-CoV2.	Début : 15/03/2021 Fin : 01/04/2021	Objectif principal: Évaluer si les paramètres de fonction VD mesurés en échocardiographie 3D (FEVD globale et axiale) diffèrent à la phase précoce du SDRA secondaire à SARS-CoV2 par comparaison aux autres causes de SDRA. Objectifs secondaires: Évaluer la reproductibilité de la mesure de la FEVD globale et axiale en échocardiographie 3D. Évaluer la corrélation entre la déformation systolique (strain) de la paroi libre du VD en 2D et les paramètres de la FEVD (globale et axiale) en 3D.	Dr Bruno EVRARD	Patient admis en réanimation pour SDRA ou SDRA secondaire au SARS CoV-2 ou AVC ou hémorragie méningée ou traumatisme grave et sous ventilation mécanique et ETO 3D réalisée
<b>OBEAMP</b>	Impact de l'Indice de la Masse Corporelle du couple sur le succès des différentes techniques d'AMP au CHU de Limoges	Début : 01/03/2020 Fin : 01/10/2023	Impact de l'Indice de la Masse Corporelle de l'homme et de la femme dans le projet parental	Caroline BOUILLE sous la responsabilité du Pr, Marie-Pierre TEISSIER	Couples suivis au centre de Procréation Médicalement Assisté situé à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant du CHU de Limoges à partir du 1er mars 2021

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>DUO TNE</b>	Prise en charge des tumeurs neuro-endocrines duodénales entre 1 et 2 cm	Début :15/03/2021 Fin : 31/10/2021	Objectif principal: Décrire le management des TNE duodénales non métastatiques,  Objectifs secondaires: Décrire des facteurs prédictifs de mauvais pronostic pour les tumeurs duodénales opérées. Comparer la morbidité entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale, Comparer la qualité de l'exérèse entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale,	Margaux MEKANN BOUV-HEZ sous la responsabilité du Dr, Nikki CHRISTOU	Patients porteurs de tumeurs neuro-endocrines duodénales mesurant entre 1 et 2 cm et pris en charge par un des centres experts du Groupe d'Etude des Tumeurs Endocrines (GTE) dont le CHU de Limoges et de Bordeaux de 2009 à 2019
<b>CIIL</b>	Place de la coelioscopie dans la prise en charge de l'infertilité inexplicée : à propos d'une étude rétrospective au CHU de Limoges de 2005 à 2018.	Début : Janvier 2021 Fin : Décembre 2021	Impact potentiel de la coelioscopie sur la fertilité	Camille LAURENS sous la responsabilité du Dr. Lise Marie DURAND	Femmes de moins de 36 ans avec une infertilité inexplicée au bilan de première intention
<b>COVI-C-TNC</b>	Impact des effets du confinement COVID-19 chez les personnes suivies au CMRR du Limousin atteintes de Troubles Neurocognitifs et vivant à domicile	Début : Janvier 2021 Fin : Décembre 2021	Déterminer les effets du confinement liés au COVID-19 (17 mars à 11 mai 2020) sur les patients souffrant de TNC vivant à domicile,	Dr Leslie Cartz-Piver sous la responsabilité du Pr TCHALLA	Patient suivi au CMRR du Limousin dont la consultation prévue entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a été annulée/ reportée du fait du confinement COVID 19
<b>REXETRIS</b>	Effet à long terme chez le Transplanté Rénal des médicaments ImmunoSuppresseurs	Début : 2022 Fin : 2025	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer l'influence de l'immunosuppression à long terme et de son ajustement fin sur le devenir du greffon et du patient en fonction des autres facteurs de risque individuels.	Pierre MARQUET	Patients transplantés rénaux
<b>ExpoTac</b>	Etude des relations exposition – effets du tacrolimus (Cmax) en transplantation rénale.	Début : 25/10/2021 Fin : 25/10/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Explorer la relation entre la concentration maximale de tacrolimus (C <sub>max</sub> ) administré par voie orale et les tremblements chez des patients transplantés rénaux au cours des deux premières années post-greffe.	Pierre MARQUET	Patients transplanté rénal (>18 ans) ayant bénéficié de Tacrolimus pendant au moins deux ans,
<b>REXETAC</b>	Relations EXposition - Effet du TACrolimus à long terme	Début :17/03/2021 Fin :17/03/2023	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluation de l'influence de chacun des principaux paramètres d'exposition au tacrolimus (C <sub>min</sub> , C <sub>max</sub> , AUC) sur le devenir du greffon et du patient greffé rénal	Pierre MARQUET	Explorer la relation entre la concentration maximale de tacrolimus (C <sub>max</sub> ) administré par voie orale et les tremblements chez des patients transplantés rénaux au cours des deux premières années post-greffe.
<b>PhenoCov</b>	Etude de l'intérêt de l'immunophénotypage des granuleux et des monocytes dans la prédiction de l'aggravation chez les patients infectés par le SARS-CoV-2	Début : 29/03/2021 Fin :31/07/2021	Evaluer l'intérêt d'un phénotypage lymphocytaire et granuleux/monocytaire simple dans la pré	Jean François FAUCHER et Jean FEUILLARD	Patients adultes avec un diagnostic virologique d'infection par le SARS-CoV-2 (confirmé par un résultat PCR +) dont la prise en charge est ambulatoire après un séjour d'au moins 6 heures aux urgences,
<b> EVAL-HEMIPASS : déjà déclarée à vérifier vieille étude</b>	Evaluation de l'action de l'équipe mobile HEMIPASS	Début : 29/03/2021 Fin :31/07/2021	Amélioration de la participation sociale	Maxence CAMPAGNAT sous la responsabilité du Pr Jean-christophe DAVIET	Patients ayant fait un accident vasculaire cérébrale et ayant bénéficié d'un suivi post-AVC, à domicile, par l'équipe mobile de rééducation et réadaptation à domicile du CHU de Limoges : "HEMIPASS" sur la période 2018-2020,
<b>SaFeMéNaGeDouTra</b>	Satisfaction des femmes sur les différentes méthodes naturelles utilisées pour la gestion de la douleur durant le travail, étude multicentrique	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer en post-partum la satisfaction des femmes sur les bienfaits des méthodes naturelles utilisées pendant le travail dans trois maternités de l'ex-Limousin (type 1, 2 et 3). OBJECTIF SECONDAIRE : Mettre en évidence les caractéristiques communes aux femmes satisfaites des méthodes naturelles.	Maëlle GUENANT (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Marie-France JAYAT	Patientes majeures ayant accouché par voie basse ou césarienne non programmée à terme d'un nouveau-né sain, à la suite d'un travail spontané ou d'un déclenchement artificiel à l'aide de prostaglandines E2.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>EDLIDPrADSagesFem SurlInEtDéDuCanDuS ein</b>	Etat des lieux des pratiques des sages-femmes sur l'information et le dépistage du cancer du sein lors du suivi gynécologique de prévention et du suivi de grossesse	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Faire un état des lieux des pratiques des sages-femmes, concernant la prévention et le dépistage du cancer du sein, en accord avec les recommandations de la HAS. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence que les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal sensibilisent les femmes aux facteurs de risques et aux facteurs protecteurs du cancer du sein lors d'une consultation gynécologique de prévention et d'un suivi de grossesse. 2- Montrer que les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal forment les femmes à l'autopalpation sénologique lors d'un suivi gynécologique de prévention et d'un suivi de grossesse. 3- Evaluer le taux de sages-femmes réalisant un examen clinique sénologique systématique en début de grossesse et lors d'un suivi gynécologique de prévention par les sages-femmes du Limousin, de l'Indre et du Cantal. 4- Mettre en évidence les éventuels freins des sages-femmes concernant la prévention et le dépistage du cancer du sein.	Marianne DE REYNIES (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Karine BOMPARD-GRANGER	Les sages-femmes hospitalières et libérales du Limousin, de l'Indre et du Cantal pratiquant du suivi gynécologique de prévention et réalisant le suivi de grossesse
<b>CO PRA SA FEM LI MU SEX FEM</b>	Connaissances et pratiques des sages-femmes de l'ancien limousin concernant les mutilations sexuelles féminines	Début : Janvier 2021 Fin : Mai /2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer les connaissances des sages-femmes de l'ancien Limousin concernant les mutilations sexuelles féminines et leurs complications. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence les pratiques des sages-femmes dans le diagnostic des MSF. 2- Mettre en évidence le taux de rencontre et les modalités de prise en charge des femmes victimes de MSF par les sages-femmes. 3- Mettre en évidence le rôle que les sages-femmes estiment avoir dans la prévention primaire des MSF. 4- Evaluer la satisfaction des sages-femmes concernant leur connaissances sur les MSF.	CHOMILIER Chloé (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Sophie Martinez	Sages-femmes exerçant dans les maternités publiques et privées de l'ancien Limousin dans différents secteurs (consultations - salle de naissance – suite de naissance); Sages-femmes libérales; Sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
<b>RO RE PE FA AL MA</b>	Rôles et ressentis des pères face à l'allaitement maternel : étude descriptive quantitative monocentrique transversale à l'aide de questionnaires	Début : Janvier 2021 Fin : Avril /2022	OBJECTIF PRINCIPAL : 'Mettre en évidence les rôles pratiques du père lors de la période d'allaitement maternel OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Mettre en évidence les différentes modalités de soutien psychologique du père envers la mère lors de la période d'allaitement maternel. 2- Secondaire 2 Mettre en évidence les ressentis du père lors de la période d'allaitement maternel.	VIGNAU Vitaline (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de BOMPARD-GRANGER Karine	Pères majeurs dont la conjointe effectue un allaitement maternel exclusif ou prédominant
<b>E de la sa des a de l'Hô Mè-En de Li con les in re pen le sé en ma sur le po-par et les con de re en ur</b>	Evaluation de la satisfaction des accouchées de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges concernant les informations reçues pendant le séjour en maternité sur le post-partum et les conseils de retour en urgence	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils de retour en urgence OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur l'allaitement maternel ou au biberon. 2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 3- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites de l'attention portée par les professionnels de santé.	Camille FRADIN (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Sarah WEHBE	Femmes majeures, parlant, lisant, écrivant le français, ayant accouché à terme à l'hôpital mère-enfant de Limoges
<b>Com Obs et Né chez pri de 40 ans et plus</b>	Les complications obstétricales et néonatales chez les primipares de 40 ans et plus : étude cas/témoins sur dossiers de 2020 à 2021	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que le taux de complications obstétricales et néonatales dans la population des primipares de 40 ans et plus est supérieur au taux de complications obstétricales et néonatales dans la population des primipares âgées de 25 ans à 39 ans, à l'HME de Limoges.	Juliette GATIPON-BACHETTE-BLANC	Patientes en primiparité, suivies et ayant accouché à l'HME de Limoges, de 40 ans et plus (cas) et entre 25 ans à 39 ans (Témoign)

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Les re de la pri tar des sa-fem de l'an Li</b>	Les représentations de la primiparité tardive des sages-femmes de l'ancien Limousin	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Mettre en évidence les représentations sociales des sages-femmes des établissements publics et privés de l'ancien Limousin concernant la primiparité tardive OBJECTIFS SECONDAIRES : 1-Montrer que les représentations de la primiparité tardive sont différentes selon les caractéristiques sociodémographiques des sages-femmes. 2- Identifier la notion d'âge seuil pour concevoir son premier enfant	ClaraGIL (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Valérie BLAIZE-GAGNERAUD	Sages-femmes diplômées d'Etat exerçant dans les secteurs public et privé de l'ancien Limousin
<b>Cons obs con</b>	Conséquences obstétricales à la suite conisation	Début : Janvier 2021 Fin : 25/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Comparer le taux d'accouchement prématuré des patientes conisées ayant accouché à l'HME avec celui de la population générale. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Comparer le taux de FCT, de RPM et de MAP des patientes conisées avec la population générale. 2 - Etudier l'existence d'un lien entre le délai « conisation – début de grossesse » et le terme de l'accouchement. 3 - Comparer la durée du travail chez une primipare conisée ayant accouché à l'HME avec la durée moyenne du travail chez les primipares non conisées dans la population générale. 4 - Comparer le taux de césariennes pour stagnation de la dilatation chez les patientes conisées et la population générale.	Marion GOUMY (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité d'Yves AUBARD	Patientes conisées ayant eu un suivi de grossesse et ayant accouché à l'HME, comparé à la population générale
<b>Comp adapt neonat nouveau-nés</b>	Comparaison de l'adaptation néonatale des nouveau-nés, nés par césarienne programmée ou par voie basse	Début : Janvier 2021 Fin : Avril 2022	Objectif Principal : Comparer l'adaptation à la vie extra-utérine des nouveaux nés à la naissance, selon qu'ils soient nés par voie basse ou par césarienne. Objectif secondaire :: Comparer cette adaptation durant les suites de naissances immédiates puis pendant le séjour en maternité	Pauline PALLIER (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Fabienne MONS	Toutes patientes ayant bénéficié de césarienne programmée à terme sur une grossesse unique sous anesthésie locorégionale, ou ayant accouché spontanément à terme.
<b>les com pli</b>	Les complications de la grossesse et de l'accouchement chez les multipares âgées de 35 à 39 ans versus les multipares âgées de 18 à 34 ans, étude de dossiers de patientes prises en charge à l'Hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021	Début : Janvier 2021 Fin : Mai 2022	Objectif principal : Risque de pathologies gestationnelles et de l'accouchement significativement augmenté chez les multipares âgées de 35 à 39 ans par rapport à celles âgées de 18 à 34 ans.	Julie TRICOCHÉ (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Julie ROUMIGUIERES	Femmes secondipares et terciipares âgées de 35 à 39 ans (cas) et de 18 à 34 ans (témoins), ayant accouché à l'HME sur la période du 01/10/2020 au 31/08/2021.
<b>ImpliPèGro</b>	Implication des pères durant la grossesse corrélée à leur vision de la paternité	Début : Janvier 2021 Fin : 16/05/2022	Objectif principal : Rechercher si la vision de la paternité est influencée par des facteurs psychosociaux. Objectifs secondaires : 1- Rechercher un lien entre l'implication des pères au cours de la grossesse, du suivi des tâches quotidiennes et leur vision de la paternité 2- Montrer les différences entre l'implication des primipères et des multipères.	Solène VERGNE (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Marie-Noëlle VOIRON	Pères majeurs, interrogés lors du 2ème jour de suite de couches
<b>Poumon PR</b>	Atteintes respiratoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde : état des lieux au CHU de Limoges, étude rétrospective, monocentrique.	Début : avril 2021 Fin : novembre 2021	Objectif principal : Détermination de la fréquence des atteintes respiratoires  Objectifs secondaires : Identification des Facteurs de risque associés Prévalence de la toxicité médicamenteuse respiratoire	Alice LEVY sous la responsabilité de Boris Melloni et Pascale Vergne-Salle	Patient majeur porteur de polyarthrite rhumatoïde hospitalisés en Rhumatologie en 2019

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Sécheresse Vaginale</b>	Satisfaction des patientes traitées par laser pour pallier la sécheresse vaginale induite par la ménopause	Début : Janvier 2021 Fin : 20/06/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Déterminer au travers d'articles scientifiques l'intérêt du laser dans le traitement de la sécheresse vaginale induite par la ménopause. OBJECTIF SECONDAIRE : Définir la satisfaction des patientes suivies par un professionnel de santé qui utilise cette méthode.	Laura DAUDON (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Agnès BARAILLE	Patiente symptomatique de sécheresse vaginale induite par la ménopause, et souhaitant avoir recours au traitement par laser,
<b>au seins acc</b>	L'auto-palpation des seins et les accouchées, âgées de 25 ans à 45 ans, de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2022	OBJECTIF PRINCIPAL : Réaliser un état des lieux de la pratique et des connaissances au sujet de l'autopalpation des seins des accouchées, âgées de 25 à 45 ans, à l'HME de Limoges. OBJECTIF SECONDAIRE : Montrer que les accouchées de l'HME de Limoges, âgées de 25 à 45 ans qui ont déjà réalisé l'AES, ont des caractéristiques particulières.	Jeanne DURAND (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de Joelle MOLLARD	Patientes entre 25 ans et 45 ans inclus ayant accouché à l'HME de Limoges
<b>E de la sa des a de l'Hô Mè-En de Li con les in re pen le sé en ma sur le po-par et les con de re en ur</b>	Evaluation de la satisfaction des accouchées de l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges concernant les informations reçues pendant le séjour en maternité sur le post-partum et les conseils de retour en urgence	Début : Janvier 2021 Fin : 15/05/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils de retour en urgence. OBJECTIFS SECONDAIRES : 1- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites des informations délivrées par les professionnels de santé sur l'allaitement maternel ou au biberon. 2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 3- Montrer que la majorité des accouchées de l'HME sont satisfaites de l'attention portée par les professionnels de santé.	FRADIN Camille (Etudiante Sage-Femme) sous la responsabilité de WEHBE Sarah	Patientes majeures ayant accouché à l'hôpital mère-enfant de Limoges
<b>FASHIONS</b>	Etude des facteurs de risque « non médicaux » d'apparition des anticorps spécifiques du donneur ("DSA") en transplantation rénale	Début : Fin : 31/12/2021	Objectif principal : Identifier des facteurs psychosociaux (dits « facteurs de risque non-médicaux ») qui pourraient être associés à l'apparition de DSA en transplantation rénale.	Caroline MONCHAUD	Patients transplantés au plus tard en 2016 : patients inclus dans les cohortes EPIGREN (2007-2012) et EPHEGREN (2012-2017)
<b>LimogesPanC</b>	Impact de la Qualité de la prise en charge globale sur la survie des patients opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique pour tumeurs malignes;	Début : 01/01/2019 Fin : 09/2019	Objectif principal : Analyser l'impact de la qualité de la prise en charge globale des patients opérés d'une DPC pour tumeurs malignes sur la survie de ces malades	Evan APOURCHAUX sous la responsabilité de Niki CHRISTOU	Patients opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique pour tumeurs malignes de la région céphalique du pancréas entre 1er janvier 2010 au 31 mars 2017,
<b>NIRS_AVC</b>	Evaluation de l'activité corticale des aires préfrontales lors de la marche des individus AVC	Début : 30/04/2021 Fin : 30/06/2021	Objectif principal : Evaluer la corrélation entre l'activité PFC et les paramètres de la marche	Maxence CAMPAGNAT	Patient avec un AVC confirmé par imagerie cérébrale
<b>CCERBER</b>	Chirurgie cardiaque et étude rétrospective des besoins d'épuration extra-rénale	début : 2021 Fin : 2022	Evaluer le recours à l'épuration extrarénale en fonction des critères d'épuration précoce ou tardives	Thèse de Olivier GUILLOT sous la responsabilité du Dr Frank PIHAN	Patient hospitalisés en réanimation de chirurgie cardiaque de janvier 2019 à Décembre 2020
<b>CLODILIM</b>	Evaluation des facteurs de risques favorisant la survenue d'infections à Clostridioides difficile au CHU de Limoges.	Début : 04/21 Fin : 04/22	Objectif principal : Evaluer les facteurs de risques des patients présentant une infection à Clostridioides difficile documentée au CHU de Limoges Objectifs secondaires : Analyser les prescriptions d'antibiotiques à risques. Evaluer la pertinence de prescription des inhibiteurs de pompe à protons (IPP) Evaluer la proportion de patients ayant une récurrence d'infection à Clostridioides difficile traitée par Fidaxomicine versus Vancomycine Per Os Evaluer la proportion d'infections nosocomiales Evaluer le coût d'hospitalisation annuel des patients hospitalisés pour une infection à Clostridioides difficile	Jean-Pascal LEBON sous la responsabilité du Pr Jean-François FAUCHER et du Dr, Nathalie GOSSE BŒUF	Tous les cas d'infections à Clostridioides difficiles (âge > 18 ans), déclarés au CHU de Limoges du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019,
<b>ECHOPOPED</b>	Intégration de l'échographie du poignet dans le dépistage des fractures de l'extrémité distale de l'avant-bras chez l'enfant aux urgences pédiatriques	Début : 05/21 fin : 09/21	Objectif principal : déterminer la faisabilité de l'intégration de l'échoscopie diagnostique du traumatisme du poignet de l'enfant dans le parcours de soin du patient aux urgences de l'HME	R0bin GIOVARA sous la responsabilité de Pr Laurent FOURCADE	Patient de 18 mois à 16 ans, admis aux urgences de l'HME pour traumatisme fermé du poignet sans déformation clinique de Mai 2020 à Mai 2021

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>POCAU</b>	Effets de la rééducation de l'équilibre sur le contrôle postural chez l'enfant atteint d'autisme	Début : 01/21 fin : 06/21	Objectif principal : Comparer l'évolution du contrôle postural en simple tâche et double tâche chez des patients TSA après un programme de rééducation	Thèse de Anaïck PERROCHON sous la responsabilité du Dr Eric LEMONNIER	Enfant âgé de 5 à 14 ans qui : - a un diagnostic de TSA : confirmé par l'ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) et l'ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) en référence au DSM-V et à la CIM-10 - a bénéficié d'un protocole de rééducation de l'équilibre centre sur le travail de l'équilibre ((exercices de déstabilisation, d'équilibre et de sauts)
<b>LIMETCCR</b>	Effet de la metformine et des benzodiazépines sur la survie des patients atteints de cancer colorectal	Début : 15/01/2021 fin : 15/06/2021	Objectif principal : Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie (globale et sans récives) chez des patients opérés de CCR et diabétiques	Tarhini ZEINAB sous la responsabilité du Pr Niki CHRISTOU	Les personnes âgées de plus de 18 ans étaient éligibles si elles avaient subi une chirurgie pour un CCR.
<b>VessIRM</b>	Evaluation prospective de l'IRM pour prédire l'envahissement musculaire des tumeurs vésicales	Début : 30/06/2021 fin : Octobre 2021	Objectif principal : Evaluer la performance diagnostique du VI-RADS à l'IRM pour prédire de l'envahissement musculaire de la vessie.	Charlotte DOUCHEZ porteur du projet sous la responsabilité Pr Aymeric ROUCHAUD	Tout patient nécessitant une Résection Trans-Urétrale de Vessie (RTUV)
<b>VO2_AVC</b>	Evaluation de l'impact de l'hypersollicitation énergétique lors de la marche sur la capacité de marche et le quotidien des individus AVC	Début : juin 2021 Fin : Octobre 2021	Objectif Principal : Évaluer le niveau de sollicitation énergétique des individus AVC lors de la marche et son association avec les autres paramètres de la marche (spatio temporels, cinématique, musculaire). Evaluer l'impact du niveau de sollicitation énergétique lors de la marche et l'autonomie, la participation sociale et la qualité de vie des individus AVC.	Maxence COMPAGNAT	Des personnes présentant des séquelles d'AVC et capables de marcher sans aide humaine sont recrutées.
<b>IMAGINE</b>	Analyse dynamique de la concentration des IMMAtures Granuleux circulant comme marqueur d'INfection sEcondaire au cours du séjour en réanimation	Début : juillet 2021 Fin : mars 2024	OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer le lien entre le pourcentage des IG circulants et le diagnostic d'une PAVM précoce (dans les sept jours suivant l'instauration de la ventilation mécanique invasive) OBJECTIFS SECONDAIRES : 1. Evaluer le lien entre l'augmentation du nombre des IG circulant et le diagnostic d'une PAVM précoce 2. Déterminer si l'ensemble des sous-populations d'IG ont toutes des caractéristiques immunosuppressives 3. Evaluer s'il y a une corrélation entre la morphologie des granuleux immatures déterminée par cytologie et les résultats de cytométrie en flux	Dr Thomas DAIX	Personnes adultes hospitalisés depuis - de 24h en réanimation pour accident vasculaire cérébral ou hémorragie méningée, sous ventilation mécanique invasive pour critères neurologiques à l'admission en réanimation
<b>Rayonnements et Chirurgie Endovasculaire</b>	Comparaison de la dose de rayon utilisé lors des procédures endovasculaires iliaques et des membres inférieurs en fonction du type d'anesthésie (anesthésie générale et rachianesthésie versus anesthésie locale et loco-régionale )	Début : 19/07/2021 Fin : 01/10/2021	OBJECTIF PRINCIPAL : montrer la présence d'une différence de rayonnement mesuré entre le groupe anesthésie générale et rachianesthésie contre le groupe anesthésie locale et locorégionale,	Maxime GOURGUE sous la responsabilité du Dr francis PESTEL	Patients ayant bénéficié d'une chirurgie endovasculaire à l'étage iliaque et ou des membres inférieurs (fémoral, poplité, jambier) sur la période de 2016 à 2019 inclus.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>PICTURE</b>	Pronostic de l'atteinte cardiaque droite dans le syndrome de détresse respiratoire aigüe à SARS-Cov-2	Début : septembre 2021 Fin : Mars 2022	<p>OBJECTIF PRINCIPAL :</p> <p>Chercher une association entre la survenue d'une atteinte ventriculaire droite identifiée par échocardiographie au cours du séjour en réanimation et la mortalité chez les patient admis pour un SDRA secondaire à une pneumopathie sévère à SARS-Cov-2.</p> <p>L'atteinte du ventricule droit est définie par la présence d'au moins un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence d'un coeur pulmonaire aigu défini par une dilatation ventriculaire droite associée à un septum paradoxal</li> <li>- Présence d'une dysfonction systolique du ventricule droit définie par une fraction d'éjection du ventricule droit (FEVD) &lt; 45%</li> <li>- Présence d'une insuffisance ventriculaire droite définie par une dilatation du ventricule droit associée à une pression veineuse centrale (PVC) &gt; 8 mmHg</li> </ul> <p>OBJECTIFS SECONDAIRES :</p> <p>Décrire la survie en réanimation selon la présence ou non d'une atteinte ventriculaire droite (comme prédéfinie) identifiée lors de la première évaluation hémodynamique par échocardiographie réalisée dans les trois premiers jours suivant l'admission.</p>	Dr Marine GOUDELIN	Patient en réanimation atteint de syndrome de détresse respiratoire aigüe à SARS-Cov-2
<b>EPISEPSIS URGENCES</b>	Analyse de la prévalence, du respect des "Bundles" et du devenir des patients en Sepsis dans les Services d'Urgences du Limousin	Début : Janvier 2022 Fin : Juillet 2022	<p>L'objectif principal est de décrire la proportion de patients traités selon les « Bundles » de la « Surviving Sepsis Campaign », à savoir la réalisation dans les 3h suivant l'admission :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Antibiothérapie</li> <li><input type="checkbox"/> Remplissage vasculaire</li> <li><input type="checkbox"/> Prélèvements des hémocultures</li> <li><input type="checkbox"/> Mesure de la lactatémie</li> </ul> <p>Objectifs secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesurer la prévalence du sepsis dans les SU</li> <li>2. Evaluer la prévalence des patients évoluant en choc septique</li> <li>3. Comparer la prévalence du sepsis avec les SCA et les AVC</li> </ol>	Dr Thomas LAFON	Patient admis dans un SU de plus de 18ans et présentant un Sepsis
<b>MAV</b>	Évaluation des coûts de l'embolisation par voie veineuse pour le traitement endovasculaire des malformations artérioveineuses (MAV) cérébrales (MAV)	Début : Décembre 2021 Fin : Décembre 2022	Comparaison des coûts de prise en charge des MAV par embolisation par voie transartérielle (TAE; Technique de référence) et par voie transveineuse (TVE; Technique à l'étude)	Augustin DONJON sous la responsabilité du Pr Aymeric ROUCHAUD	Patient dont la dernière MAV a été traitée par embolisation au CHU de Limoges. Ce patient doit avoir une occlusion totale de la MAVc après ,la dernière intervention ou une occlusion partielle sans autre autre embolisation de prévue
<b>RECOVAGEN</b>	Recherche sur les neuropathies périphériques afin d'améliorer leur diagnostic génétique et leur compréhension physiopathologique,	début : 05/10/2021 Fin : 31/12/2026	<p>Objectif principal : Découvrir de nouveaux variants pathogènes responsables de Neuropathies Périphériques,</p> <p>Objectifs secondaires : Comprendre la physiopathologie associée à ces nouveaux variants,</p>	Pauline CHAZELAS Pierre Antoine FAYE sous la responsabilité de Corinne MAGDELAINE, Frédéric FAVREAU, Franck STURTZ, Anne-Sophie LIA	Patient dont l'ADN a été analysé par le service de Biochimie et Génétique Moléculaire, associé ou non à une neuropathie du 01/01/2000 au 31/12/2026,
<b>CERAMIL</b>	Reconstruction sternale par la prothèse CERAMIL après exérèse oncologique. Etude observationnelle des 6 premières années d'implantation	début : janvier 2021 Fin: Décembre 2021	Evaluer la sureté et l'efficacité de l'implantation de cette prothèse	Thèse d'Annaëlle CHERMAT Dr, François BERTIN ; Dr, Jérémy TRICARD;	Patients opérés dans le monde pour reconstruction sternale par la prothèse CERAMIL® non chargée en antibiotique après exérèse oncologique.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Spatial-ACG</b>	Identification des acteurs moléculaires inflammatoires dans l'artérite à cellules géantes (ACG) par l'utilisation du profilage spatial in situ du transcriptome entier ou "Identifying inflammatory molecular actors in giant cell arteritis by using in situ whole transcriptome spatial profiling"	Début : Juillet 2021 Fin : Décembre 2021	Objectif principal : Définir de nouveaux biomarqueurs associés à l'ACG à partir des biopsies d'artères temporales (BAT), effectuées en routine, et conservées dans une collection biologique. Objectifs secondaires : 1, Caractériser le profil transcriptomique de chaque couche artérielle au cours de l'ACG, 2, Identifier un profil transcriptomique au sein de chaque couche selon le sexe des patients, 3, Identifier un profil transcriptomique au sein de chaque couche selon la sévérité de la GCA	Dr, Simon PARREAU sous la responsabilité du Dr, LY Kim	Hommes et femmes d'âge >50 ans, ayant eu une biopsie d'artère temporale pour suspicion d'artérite à cellules géantes (GCA), positive pour les malades, et négative pour les patients contrôlés,
<b>ICTIA</b>	Impact Clinique du Traitement Injectable lors de la phase Aiguë de la thrombose veineuse profonde (TVP)	Début : 01/06/2021 Fin : 01/12/2022	Objectif principal : Evaluation des pratiques de prise en charge de la TVP pendant la phase aiguë, Objectifs secondaires : 1, Comparaison de l'amélioration clinique sous traitement anticoagulant injectable et oral pendant la phase aiguë de la TVP. 2, Comparaison de la récurrence à un mois sous traitement anticoagulant injectable et oral pendant la phase aiguë de la TVP.	Dr, Ileana DESORMAIS	Patients avec une Thrombose Veineuse Profonde des membres supérieurs ou inférieurs écho-diagnostiquée dans le service de chirurgie et de médecine vasculaire du CHU de Limoges et sous traitement anticoagulant depuis moins de 48 heures.
<b>CARBLARA</b>	Caractéristiques des tumeurs de vessie après prise en charge d'un cancer de prostate	Début : Août 2021 Fin : Octobre 2021	Objectif principal : Définir si la radiothérapie a un impact sur la progression des cancers de vessie secondaire Objectifs secondaires : 1, Comparer la fréquence des variants histologiques de cancer de vessie selon l'antécédent de radiothérapie 2, Evaluer l'incidence du tabagisme selon les groupes 3, Comparer les fréquences des récurrences de cancer de vessie selon les groupes	ROUSSEAU Sybille sous la responsabilité du Pr DESCAZEAUD Aurélien	2 Cohortes de patients : - Patients ayant eu un cancer de vessie entre 2005 et 2020 avec un antécédent de cancer de prostate, - Patients avec un cancer de vessie entre 2011 et 2012 chez l'homme sans antécédent de radiothérapie
<b>ENIMS</b>	Conséquences néonatales du Covid-19 ou État néonatal suite à une infection maternelle au SARS-CoV-2 pendant la grossesse	Début : 01/02/2022 Fin : 15/05/2023	Objectif principal : Faire un état des lieux de l'état néonatal suite à une infection maternelle au Sars-CoV-2 pendant la grossesse. Objectifs secondaires : 1, Comparer l'état néonatal selon le terme de la grossesse auquel s'est déclarée l'infection au SARS-CoV-2 et selon la gravité de la maladie.	GARDEY DE SOOS Colette sous la responsabilité de VOIRON Marie-Noëlle _Mémoire de 4ème année de SF	Femmes ayant accouchées à l'HME entre février 2021 et janvier 2022 avec un test PCR positif au Sars-CoV-2 pendant leur grossesse,
<b>BIOPENDELTA</b>	Le dépistage de l'hépatite delta en France métropolitaine est-il adapté ? Etude préliminaire du projet national Delta Describe	Début : 01/02/2022 Fin : 25/06/2022	Objectif principal : Vérifier si le dépistage de l'hépatite Delta (VHD) est fait de manière systématique chez les patients porteurs de l'antigène de surface S (AgHBs) de l'hépatite B (VHB) au CHU de Limoges. Objectifs secondaires : 1, Décrire pour le site du CHU de Limoges les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients et le profil des prescripteurs pour tous les tests positifs sur une période de 4 ans (2017-2020). 2, Décrire les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients testés pour le VHD et le VHB, leur répartition géographique et le profil des prescripteurs en France métropolitaine pour chaque année. 3, Evaluer les pratiques de dépistage du VHD des principaux laboratoires régionaux de France et décrire les méthodes techniques utilisées pour le dosage de l'ARN du VHD.	BERNARDIN Myrienne sous la responsabilité du Pr, LOUSTAUD-RATTI Véronique	Patients porteurs de l'antigène de surface S (AgHBs) de l'hépatite B (VHB) au CHU de Limoges.
<b>PACIFIC Trial</b>	Influence pronostique de la prise de médicaments immunosuppresseurs chez les patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique	Début : 01/02/2022 Fin : 01/10/2022	Objectif principal : Déterminer si l'immunodépression hors chimiothérapie est associée à une surmortalité précoce chez les patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique.	Dr Julien VAIDIE	Patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>COMM VIL-HOP</b>	Etude de la satisfaction des professionnels de santé sur la communication ville-hôpital dans le cadre du suivi post-opératoire des patients de chirurgie pédiatrique, pris en charge en ambulatoire à l'HME, à l'aide des outils numériques sécurisés de santé.	Début :01/08/2021 Fin : 30/12/2022	Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la communication ville - hôpital Objectifs secondaires : 1, Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien 2, Evaluer 3, Evaluer  l'utilisation des outils numériques l'association entre zone géographique et utilisation des outils numériques	Agnese BOVIO (interne en médecine générale) sous la responsabilité de Pr, Laurent FOURCADE	Professionnels de santé du CHU (Chirurgiens pédiatriques) et Médecins Traitants
<b>EvEndS</b>	Evaluation des données pronostiques des patients pris en charge pour une endocardite aigue a streptocoque au CHU de Limoges entre 2016 et 2021 en fonction des traitements antibiotiques utilisés	Début :01/01/2022 Fin : 01/10/2023	Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la communication ville - hôpital Objectifs secondaires : 1, Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien 2, Evaluer 3, Evaluer  l'utilisation des outils numériques l'association entre zone géographique et utilisation des outils numériques	Camille SIGNOLLET sous la responsabilité du Dr, Anne CYPIERRE	Patients hospitalisés au CHU entre 2016 et 2021 (inclus) traités pour une endocardite aigue à streptocoque oral ou digestif,
<b>NADouPH-E</b>	Noradrénaline versus phényléphrine-éphedrine : Comparaison de deux protocoles vasopresseurs dans la prévention de l'hypotension artérielle lors des césariennes sous rachianesthésie	début :17/01/2022 Fin : 30/04/2022	Objectif principal : Comparer la proportion d'hypotension artérielle systolique avant extraction fœtale dans chaque groupe Objectifs secondaires : 1, Comparer la proportion d'hypotension artérielle systolique sévère dans chaque groupe 2, Comparer la durée d'hypotension artérielle systolique dans chaque groupe 3, Comparer le nombre d'interventions médicales sur les débits et boli de vasopresseur 4, Evaluer le retentissement hémodynamique de l'hypotension artérielle dans chaque groupe 5, Evaluer la sécurité des deux protocoles de vasopresseur 6, Evaluer le bien-être fœtal des deux protocoles 7, Evaluer la différence de coût des deux protocoles	Alexandre MARTINS-BALTAR sous la responsabilité de Patrick SENGES	Césariennes sous rachianesthésie à partir du 01/03/2021 jusqu'au 31/12/2021
<b>TélémedDG</b>	Impact de l'outil de télémédecine MyDiabby Healthcare depuis sa mise en place en 2017 sur les complications du diabète gesttationnel chez les femmes prises en charge à l'hôpital mère enfant de Limoges,	Début :03/08/2021 Fin : 28/10/2021	Diminution du nombre de macrosomie, césarienne et pré-eclampsie,	BIDAN Laura _ Pr Marie-Pierre TEISSIER	Patientes avec un diabète gestationnel bénéficiant d'un suivi avec le dispositif "my Diabby" du 01/09/2017 au 31/12/2020
<b>METCCR</b>	Implication de la metformine dans la prévention de la cancérogénèse colorectale : action sur le couple Sortiline (NTSR3)-E Cadherin	Début : 01/01/2022 Fin : 31/12/2024	Comparer les taux d'expression de E cadherine et sortiline par stade tumoral et profil mutation	Dr Niki Christou	Patients avec un cancer colorectal
<b>COVIPB</b>	Etude bicentrique de l'impact du Covid-19 et des vaccins anti-covid-19 sur l'incidence et la gravité de la pemphigoïde bulleuse dans la région Nouvelle Aquitaine.	Début : 01/02/2022 Fin : 02/04/2023	Etudier l'incidence des pemphigoïdes bulleuses avant le covid19, pendant le covid19 puis lors des campagnes vaccinales	M Marco GRASSI sous la responsabilité du Pr, Philippe BERNARD	Patients présentant une pemphigoïde bulleuse diagnostiquée entre 2017 et 2021

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
FADOPO	Évaluation des facteurs personnels prédictifs de douleurs chroniques post opératoires suite à une pose de prothèse de membre inférieur de hanche et de genou.	Début : 15/02/2022 Fin : 30/11/2023	Objectif principal : Facteurs associés à une douleur à 3 mois (1 ère consultation de suivi post opératoire); Objectifs secondaires : 1, Facteurs associés à une douleur à 6 mois (2 ème consultation de suivi post opératoire) 2, 3, Facteurs associés à une douleur neuropathique à 3 mois Facteurs associés à une douleur neuropathique à 6 mois (2 ème consultation de suivi post opératoire) 4, Fréquence de patient douloureux à 3 mois 5, Fréquence de patient douloureux à 6 mois 6, Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 3 mois 7, Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 6 mois	Mme AKBA Saoussane (Interne en Médecine Générale) sous la responsabilité du Pr VERGNE-SALLE Pascale et Dr, ROZETTE Marc	Patients hospitalisés à partir du 1er janvier 2022 pour la pose d'une prothèse de hanche ou du genou.
Infarctus et Hyperuricémie	Etude prospective sur l'incidence de l'hyperuricémie chez les patients victimes d'infarctus du myocarde : quelle est sa place dans les facteurs de risque cardio-vasculaire	Début : Mai 2021 Fin : Octobre 2021	Objectif principal : Déterminer l'incidence de l'hyperuricémie chez les patients présentant un infarctus du myocarde Objectifs secondaires : 2, Évaluer les facteurs de risque classiques d'infarctus du myocarde 3, Évaluer les facteurs de risques d'hyperuricémie en dehors du syndrome métabolique 4, Établir si possible un seuil d'uricémie critique	Mme BRUNOT Cécile (Interne en Médecine Générale) sous la responsabilité de Lambert De Cursay Grégoire (CH de Brive)	Patients hospitalisés dans le service de cardiologie du CH de Brive pour un Infarctus du myocarde,
S3ASP	Dépistage de l'Anévrisme de l'Aorte Abdominale (AAA) chez les sujets ayant un accident vasculaire cérébral	Début : Juill 2021 Fin : Octobre 2022	Evaluer la prévalence des AAA chez les sujet admis pour un accident vasculaire ischémique (transitoire ou constitué)	M RENARD Kévin (Interne) sous la responsabilité de Philippe LACROIX	Tout sujet admis pour un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) ischémique ou un AIT (Accident Ischémique Transitoire)
anti-HER2IPA	Impact du mode d'administration des anti-HER2 (sous cutané versus intraveineuse) sur la satisfaction des patients et externalisation à domicile notamment possible par l'infirmière de pratiques avancées.	Début : Fin : Octobre 2023	Évaluation de la satisfaction et de la qualité de vie des patients	Mme PALLARO Solène (Interne) sous la responsabilité du Dr, Elise DELUCHE et du Dr, Gaëlle MAILLAN	Patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif, traités par trastuzumab ou trastuzumab-pertuzumab, un anti-HER2) au Chu de Limoges en 2022
EFC-DTI	Evaluation des Fonctions Neurocognitives chez les patients atteint de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge) et traités par Injections intravitréennes d'anti-VEGF.	Début : 09/06/2021 Fin : 30/09/2022	Objectif Principal : Comparer les résultats du test neurocognitif entre les différents sous groupe et déterminer si il existe une différence et surtout une détérioration des fonctions dans les groupes ayant bénéficiés de nombreuses injections. Objectif secondaire : S'assurer que les résultats sont similaires en excluant les facteurs confondants (acuité visuelle basse, facteurs de risque cardiovasculaire...)	Mme FANTINI Amandine (Interne) (sous la responsabilité du Pr, Pierre-Yves ROBERT	Patient de atteintes de DMLA Exsudative
Néphropathie, IgA et récive	Caractéristiques cliniques des récives précoces de néphropathie primitive à dépôts mésangiaux d'IgA après transplantation rénale	Début : Fin : 22/10/2021	Objectif Principal : Description des caractéristiques cliniques des patients ayant présenté une	Mme TOCH Chanty sous la responsabilité de Fatouma TOURE	Patients greffés pour néphropathie à dépôts d'IgA confirmée par biopsie rénale,
Tumeurs cérébrales et impact RCP	Impact de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) sur la prise en charge et la survie des patients présentant une tumeur cérébrale en situation de vraie vie	Début: 15/09/2021 Fin : 15/09/2022	Objectif principal : Evaluer le taux de concordance entre les décisions prises en RCP et la pratique courante en ce qui concerne la prise en charge des patients Objectifs secondaires : -Evaluer si l'application en pratique réelle des décisions prises en RCP modifie la survie des patients Décrire des raisons de non-application en pratique réelle des décisions prises en RCP Recueil de type de décision prise en RCP en fonction de la tumeur.	Clara Naessens interne en Oncologie médicalke sous la responsabilité du Dr Elise DELUCHE	Patient dont le dossier médical a été présenté au moins une fois en RCP au début de sa prise en charge, avec une tumeur cérébrale primitive opu secondaire. Patient avec tou cancer confondu, adjuvant ou métastatique (tumeur primitive du système nerveux central, métastase cérébrale d'un autre cancer)
KT PAIN	Evaluation de l'effet de la voix de la mère sur la douleur du nouveau-né prématuré lors de la pose de catheter central épicutanéocave	Début : Juin 2020 Fin : Juin 2022	Objectif principal : Mesure des valeurs les plus élevées pour chaque enfant du score de FANS et comparaison entre le groupe « avec » et « sans » utilisation de la voix maternelle,	Audrey FLOURS, interne en pédiatrie sous la responsabilité du Dr Fabienne MONS et Dr Laure PONTHER	Nouveaux-nés de moins de 37 semaines d'aménorrhées bénéficiant de la pose d'un cathéter (voie centrale ou KTEC),

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>TAGLIM</b>	Les tests cutanés aux héparines et apparentés chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal, consultant au service d'allergologie du CHU de Limoges entre mai 2020 et mai 2021.	Début : 01/05/2020 Fin : 04/10/2021	Objectif principal : Evaluation de la proportion de patients avec des tests cutanés positifs aux héparines ou dérivés, chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal consultant au service de pneumo-allergologie du CHU de Limoges entre Mai 2020 et Mai 2021 Objectifs secondaires : Déterminer les facteurs pouvant influencer la réactivité des tests cutanés aux héparines et dérivés, chez les patients sensibilisés à l'alpha-gal consultant au service de pneumo-allergologie du CHU de Limoges entre Mai 2020 et Mai 2021, Décrire la répartition géographique des sujets allergiques selon le département de résidence. Proportion de sujets sensibilisés à l'alpha-gal rapportant un antécédent de piqure de tique, Proportion de sujets allergiques, rapportant un érythème local au point de morsure,	Thèse de de Salomon COUMES sous la responsabilité du Dr Elisabeth BELLET	Patients sensibilisés à l'alpha-gal (>0.35 kU/L), âgés de plus de 18 ans ayant eu au moins 2 tests cutanés parmi lesquels le Fondaparinux et une prise de sang contenant au moins les IgE spécifiques alpha gal, bœuf, porc. Patient consultants au service d'allergologie entre mai 2020 et avril 2021
<b>IAdEC</b>	Impact d'une expertise infectiologique sur l'évolution des sujets en ischémie critique	Début : Fin : 10/2022	Objectif principal : Evaluer la diminution de la morbidité	Thèse de Ali AIT sous la responsabilité du Pr Philippe LACROIX et Dr François PESTEIL	Patient avec une Artériopathie Oblitérante des membres inférieurs(AOMI) de stade IV hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire du chu de Limoges entre 2013 et 2020 ayant bénéficié d'une amputation mineure et de la réalisation de biopsies osseuses Ce patient est déjà inclus dans une étude COPART (Influence de contrôle des principaux facteurs de risque d'athérombose sur le pronostic général du patient en ischémie permanente hospitalisé,
<b>Intensité soin tumeurs</b>	Indicateurs d'intensité de soins en fin de vie chez les patients traités pour une tumeur solide, une étude descriptive mono-centrique	Début : 01/11/2021 Fin : 04/2022	Objectif principal : Mesurer l'intensité de soins sur le dernier mois de vie Objectif secondaire : Décrire la population de patients concernés Décrire le parcours de soins de prise en charge sur les derniers mois de vie	Thèse de Yanis OUERK sous la responsabilité de Elise DELUCHE	Patients décédés entre le 01/06/2018 et le 01/06/2021 domiciliés à LIMOGES qui on reçu un traitement anticancéreux intraveineux dans les 5 ans avant le décès suivi en ONCOLOGIE et UOTC pour une prise en charge d'une tumeur solide
<b>Cancer du sein et Séquençage NGS</b>	Oncogénétique théranostique du cancer du sein : étude des résultats de séquençage NGS de 103 patientes	Début : Fin : 11/2021	Décrire la performance diagnostic des examens réalisés	Alexandre PERANI	Femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont une indication à l'étude constitutionnelle des gènes majeurs de prédispositions aux cancers du sein et de l'ovaire
<b>ITTEP</b>	Incidentalomes thyroïdiens au TEP : caractéristiques et prise en charge	Début : 17/11/2020 Fin : 17/11/2021	Déterminer les facteurs associés à la malignité des incidentalomes thyroïdien au TEP ( Tomographie par émission de positon)	Robin MAS	Personne âgée de plus de 18 ans avec une hypermétabolisme thyroïdien au TEP-TDM qu'importe le radiotraceur. Entre le 01/01/2015 et le 01/06/2021
<b>CHORDOME</b>	Etude biomoléculaire d'une série de chordome	Début : 01/06/2021 Fin : 01/06/2022	Description des anomalies cytogénétiques par aCGH et mise en évidence de mutation génétique par Next génération sequencing (NGS)	Henri SALLE sous la responsabilité du Pr François LABROUSSE	Tout patient opéré d'un chordome au CHU de Limoges et Hôpital LARIBOISIERE
<b>GLIOBLASTOME et détection mutation EGFRvIII</b>	Mise au point d'une technique de détection d'une mutation d'un récepteur membranaires (EGFRvIII) en vue de sélectionner des patients atteints d' un glioblastome pour des essais cliniques ciblant cette mutaion	Début : 17/06/2020 Fin : 17/06/2021	Mise en place d'une technique Immunohistochimie	Maxence RAUTURIER sous la responsabilité du dr Karine DURAND	Patient majeur avec un glioblastome vivante ou décédé
<b>Réparation de l'ADN et discordance entre 2 techniques</b>	Analyse des discordances entre 2 techniques de détection de défauts dans le système de réparation de l'ADN	Début 01/06/2020 Fin : 01/06/2021	Objectif principal : Développer une méthode d'analyse des résultats PCR permettant de lever la discordance observée avec l'immunohistochimie Objectif secondaire : Déterminer l'impact du pourcentage de cellules tumorales des échantillons sur la prévalence de cas discordants	Camille GUIBERT sous la responsabilité de Karine DURAND	Patient de plus de 18 ans ayant un résultat discordant

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>MEOPA 19</b>	Modification de l'extubation liée à la Covid 19	Début : 05/2020 Fin : 03/05/2021	Objectif principal : mesurer l'adhésion du personnel d'anesthésie aux changements de pratiques Objectifs secondaires : Evaluer l'impact de l'extubation au bloc opératoire sur le parcours patient Déterminer l'impact économique de cette pratique ressenti du personnel soignant en SSPI  Evaluer le	Cédric BRABANT, Audrey GUIGNARD, Benjamin MONZIE, Nicolas MOURET, Maxime RAFFARD sous la responsabilité du Dr Elodie COUVE DEACON	Personnel du Bloc DVU, orthopédie, ORL. Patient ayant eu nune AG. Les infirmière, IADE, MAR, Interne, cadre
<b>Taux de grossesse et deux attitudes de congélations embryonnaires</b>	Comparaison des taux de grossesse cumulés par tentative entre 2 attitudes de congélation embryonnaire différentes au centre d' AMP du CHU de Limoges en 2018 et 2019	Début : 21/04/2020 Fin : 21/04/2022	Objectif principal : Comparer les taux de grossesse (echographie ) cumulé par ponction entre les attitudes du centre d' AMP au chu de Limoges en 2018 et 2019	Camille VIALARET sous la responsabilité de Lise Marie DURAND	Tous les couples ayant eu une ponction ovarienne entre le 01/01/2018 et le 21/12/2019
<b>Diabète et vaccination</b>	Influence de la sensibilisation des sujets diabétiques au risque infectieux, sur l'évolution de l'état vaccinal, 3 ans après la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique	Début : 30/01/2020 Fin : 28/05/2021	Objectif principal :Etat fdes lieux de la vaccination chez le patient diabétique au sein du CHU de Limoges	Florine DESBORDES sous la responsabilité de Marie-Pierre TEISSIER	Sujets diabétiques (de plus de 18 ans) pris en charge de novembre 2018 à janvier 2020,
<b>Cancer prostate et comparaison entre hypofractionnement et fractionnement conventionnel</b>	Comparaison entre l'hypofractionnement et le fractionnement conventionnel dans le cancer de la prostate tous stades confondus : analyse rétrospective de la survie sans rechute biochimique, de la toxicité aiguë et tardive et de l'impact socio-économique au CHU de Limoges.	Début : 21/02/2020 Fin : 21/05/2021	Objectif principal : survie sans progression biochimique Objectifs secondaires : Survie globale Toxicité précoce et tardive Impact socio-économique	Elodie GILBERT sius la responsabilité du Pr Pierre CLAVERE	Homme avec un cancer de la prostate ( tous stades confondus) prouvé histologiquement
<b>micrositeKTC</b>	Impact du microsite sur le nombre de ponction veineuse totale pour la pose d'un KTEC chez un nouveau-né	Rétrospective (janvier 2019-janvier 2022)	Objectif principal: Nombre de ponctions veineuses totales pour la pose de KTEC chez le nouveau-né	Hortense Miane sous la responsabilités du Dr PONTHER	Mère de nouveaux-nés hospitalisés en néonatalogie
<b>reaVildol</b>	impact de l'utilisation de la réalité virtuelle sur la douleur et l'anxiété médiées par le retrait des prothèses en réanimation pédiatrique	Début : Janvier 2022 Fin : Aout 2022	Objectif principal : évaluation de la douleur secondaire au retarit de prothèses en réanimation pédiatrique (étude de pratique courante)	Domitille Lecroart sous la responsabilité du Dr Mowendabeka	Enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation pédiatrique
<b>Diabète et Covid chez l'enfant</b>	Impact du confinement lié au Covid sur l'équilibre du diabète de type 1 chez l'enfant	Début : Janvier 2020 Fin : Juin 2020	Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement	Camille Fray sous la responsabilité du Dr Ponthier	Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1
<b>Grossesse tabac impact CO sur Fœtus</b>	Grossesse et tabac Impact du CO (Monoxyde de Carbone) sur les fœtus en salle de naissance Etude cas témoins un Centre Hospitalier Universitaire de Limoges	Début : 01/01/2021 Fin : 25/06/2021	Objectif principal :Evaluer l'effet d'un taux élevé de CO expiré sur le rythme cardiaque fœtal en salle de naissance Objectif secondaire: Evaluer l'effet d'un taux élevé de CO expiré sur les principales caractéristiques néonatales et le déroulement de l'accouchement	Nadia MOHAND-O'AMAR sous la responsabilité du Pr Yves AUBARD	Femme ayant accouché entre le 1/01/2009 et le 01/01/2019

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>Doubt Fract IA</b>	Performances d'une solution d'intelligence artificielle en cas de doute diagnostique sur fracture	Début : Fin : NA/05/2022	<p>Objectif principal : Évaluer l'impact diagnostique du logiciel d'Intelligence Artificielle (BoneView) chez les patients admis au SU en contexte traumatique pour lesquels il y a un doute diagnostique de fracture par le clinicien sur les clichés de radiographie standard</p> <p>Objectif Secondaire :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Performance pronostique de la solution d'intelligence artificielle</li> <li>2) Évaluer l'impact de la solution d'intelligence artificielle sur la réalisation d'une tomodensitométrie complémentaire</li> <li>3) Évaluer l'impact sur la durée moyenne de séjour (DMS) au service des urgences (SU)</li> <li>4) Évaluer la prévalence des fractures dites associées à la fracture initiale et passées inaperçues à la première lecture</li> <li>5) Évaluer la diminution du recours à l'avis orthopédique sur doute sur fracture</li> </ol>	Camille DAVID sous la responsabilité de Aymeric ROUCHAUD	Patient de plus de 18 admis au SU du CHU de LIMOGES pour un motif traumatologique et pour lequel le cliché radiologique standard ne permet de confirmer/exclure avec certitude la présence d'une fracture osseuse une TDM complémentaire a été demandé au SU
<b>CYTOTECT</b>	Vulnérabilité des femmes enceintes suivies à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges, diagnostiquées positives ou fortement suspectes à la COVID-19 durant une période de la pandémie	Début : 15/02/2021 Fin : 15/04/2021	<p>Général : L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact psychologique et physique des patientes enceintes suivies à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant (HME) de LIMOGES, diagnostiquées positives à la COVID-19 ou fortement suspectes, depuis la première vague pandémique, du 17 Mars 2020 au 17 Mars 2021. Cette étude s'appuiera sur la vulnérabilité de ces patientes durant leur grossesse ou période pré conceptionnelle et leur accouchement</p> <p>Spécifiques : - Identifier les complications obstétricales et périnatales chez ces femmes enceintes ayant contracté de la Covid-19 ou fortement suspectées, durant leur grossesse et l'accouchement</p> <p>-- Analyser les répercussions psychologiques de la COVID-19 chez ces parturientes, en évaluant le stress post-traumatique des patientes ayant été infectée par la COVID-19, sur une période allant de la première vague pandémique à leur post partum</p> <p>- Evaluer la prise en charge de ces femmes de l'HME pendant la pandémie, tout au long de leur suivi à l'HME durant la période prédéfinie</p>	Maryse GASQUE sous la responsabilité du Pr Yves AUBARD	Femmes enceintes suivies à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges, diagnostiquées positives ou fortement suspectes à la COVID-19. Patiente non francophone.
<b>Projets enregistrés en 2022</b>					
<b>IMPEPICO</b>	Impact de la covid19 dans la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires au CHU de Limoges	Début : 01/12/2021 Fin : 30/01/2022	Objectif principal : Description et comparaison de la répartition des caractéristiques cliniques, des stades et du taux d'abstinence thérapeutique chez les patients suivis au CHU de Limoges pour un Cancer Broncho-Pulmonaire en 2020 comparativement à l'année 2019	Mme Lina ATLAGH sous la responsabilité du Pr, Alain VERGNENEGRE	Paitents diagnostiqués au CHU de Limoges pour un cancer broncho-pulmonaire tous types hystologiques confondus, durant les années 2019 et 2020
<b>BEST</b>	Evaluation du bloc du Serratus comme alternative à l'analgésie périmédullaire dans le traumatisme thoracique grave	Début : 01/04/2022 Fin : 01/06/2022	Comparer le risque d'être placé sous ventilation mécanique de patients traités par analgésie conventionnelle simple à une analgésie couplée à un bloc du serratus	Dr GILBERT Guillaume	Dans une population de personnes ayant subis un traumatisme thoracique grave
<b>RCT</b>	Tumeur par collision rénale : 3 autres rapports de cas	Début : Fin : 15/09/2022	Decrire 3 cas de tumeurs rénales rares	Valère BELLE MBOU	Patient présentant au moins simultanément 2 tumeurs rénales
<b>PREVALAUT</b>	Mesure de la prévalence des Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) en Haute Vienne	Début : Fin : Octobre 2023	Objectif principal : Prévalence de l'autisme en haute vienne des enfants nés en 2012, 2013, 2014 Objectif secondaire : Pourcentage d'enfants autistes diagnostiqués par le Centre ressource Autisme Limousin	Eric LEMONNIER	Patient ayant été diagnostiqué autiste au Centre Ressource Autisme. Ce diagnostic figure sur les certificats Maison Départementale des Personnes Handicapée et sur la demande d'exonération du ticket modérateur

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>VEINOSAFE</b>	Complications du traitement des malformations artérioveineuses (MAV) cérébrales	Début : 10/10/2022 Fin : 31/12/2023	<p>Objectif Principal : L'apparition d'un hypersignal DIFFUSION restreint n'est pas plus fréquent lors de l'embolisation transveineuse d'une MAV (Malformation artérioveineuse cérébrales) que par embolisation transarterielle.</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'apparition d'un hypersignal diffusion sans restriction de l'ADC (coefficient de diffusion apparent) n'est pas plus fréquent par embolisation transveineuse d'une MAV que par embolisation transarterielle.</li> <li>2) L'apparition d'un hyposignal T2* n'est pas plus fréquent par embolisation transveineuse d'une MAV que par embolisation transarterielle.</li> <li>3) Évaluer la sécurité du traitement par voie TVE (embolisation par voie transveineuse) comparativement à la voie TVE pendant la procédure (avant injection d'agents emboliques).</li> <li>4) Évaluer les paramètres en lien avec le risque du traitement par voie TVE sur l'angio-architecture veineuse et nidale</li> </ol>	Tabata LAMIRAUX	Patient de plus de 18 ans avec une dernière session d'embolisation de malformations artérioveineuses cérébrale
<b>BRIANCE</b>	Détection des anévrismes cérébraux causés par une endocardite infectieuse (infection cardiaque)	Début : 11/10/2022 Fin : 31/12/2023	<p>Objectif Principal : Identifier les marqueurs IRM (Imagerie par Résonance magnétique) capables de prédire (ou d'exclure) la présence d'anévrismes mycotiques intracrâniens en angiographie cérébrale</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Préciser l'impact sur l'issue clinique des différentes lésions visibles en Imagerie cérébrale.</li> <li>2) Mieux estimer le taux d'anévrismes mycotiques intracrâniens chez les endocardites infectieuses avérés.</li> <li>3) Analyser le panel de prise en charge au sein de ces centres experts français participants.</li> </ol>	Géraud FORESTIER	Patients de plus de 18 ans atteints d'une endocardite active certaine du cœur gauche d'après les critères de Duke modifiés. Patients explorés par artériographie cérébrale et IRM cérébrale (réalisée du 01/08/2022 au 01/08/2023) dans le cadre du soin courant, avec un délai de moins de 48 h entre les 2 examens.
<b>BIOPENDELTA</b>	Le dépistage de l'hépatite delta en France métropolitaine est-il adapté ? Etude préliminaire du projet national Delta Describe	Début : 13/01/2022 Fin : 25/06/2022	<p>Objectif Principal : Vérifier si le dépistage de l'hépatite Delta (VHD) est fait de manière systématique chez les patients porteurs de l'antigène de surface S (AgHBs) de l'hépatite B (VHB) au CHU de Limoges.</p> <p>Objectifs secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Décrire pour le site du CHU de Limoges les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients et le profil des prescripteurs pour tous les tests positifs sur une période de 4 ans (2017-2020).</li> <li>2) Décrire les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients testés pour le VHD et le VHB, leur répartition géographique et le profil des prescripteurs en France métropolitaine pour chaque année.</li> <li>3) Evaluer les pratiques de dépistage du VHD des principaux laboratoires régionaux de France et décrire les méthodes techniques utilisées pour le dosage de l'ARN du VHD.</li> </ol>	Myriamne BERNARDIN sous la responsabilité du Pr Véronique LOUSTAUD RATTI	Patient de plus de 18 ans testé pour l'Antigène de surface S (AgHBs)
<b>RIDAT</b>	Recherche de marqueurs indiquant une réponse thérapeutique à la bumétanide dans une population de personnes Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA)	Début : 01/10/2022 Fin : 01/12/2022	Recherche de marqueurs indiquant une réponse à la bumétanide chez les patients et leur famille	Cristina MASERAS sous la responsabilité du Dr Eric LEMONNIER	Patient ayant un diagnostic d'autisme ou Trouble du Spectre de l'Autisme et avoir répondu favorablement ou non à la bumétanide
<b>ClinMolCancer</b>	Aide de la biologie moléculaire haut-débit pour la prise en charge en clinique des patients en impasse thérapeutique	Début : 01/10/2022 Fin : 30/01/2023	<p>Objectif Principal : Déterminer l'impact réel de l'incorporation systématique de l'analyse par NGS 324 gènes FoundationOne dans différent cancer en impasse thérapeutique</p> <p>Objectif Secondaire : Déterminer le pourcentage d'échec d'analyse en fonction du support biologique (tissu solide versus ADN tumoral circulant) et du type de cancer</p>	Sandra PINET sous la responsabilité de Elise DELUCHE	Patient ayant bénéficié d'un test génomique de la société Roche and Foundation Médecine(FMI) Inc sur sa tumeur solide ou son sang (ADN tumoral circulant)
<b>DN4NPF</b>	Intérêt du score DN4 dans le diagnostic de la neuropathie des petites fibres	Début : 01/11/2022 Fin : 31/12/2023	Evaluer la qualité métrologique du DN4 (questionnaire qui estime la probabilité d'une douleurs neuropathiques) dans la neuropathie des petites fibres	Simon FRACHET sous la responsabilité du Pr Laurent MAGY	Patient ayant bénéficié d'une biopsie cutanée dans le service de neurologie du CHU de Limoges et ayant complété le questionnaire DN4

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>PRICHAME80</b>	Prise en charge du mélanome chez le sujet âgé	Début : 05/2023 Fin : 10/2023	<p>Objectif Principal : Comparer les pratiques de prise en charge des malades âgés de 80 ans et plus, atteints de mélanome avec un Breslow supérieur à 1 mm ou d'un cancer primitif inconnu et métastatique à celle des malades de moins de 80 ans suivis dans le service de dermatologie du CHU de Limoges de 2018 à 2022 (Breslow = indice utilisé dans l'évaluation histologique du pronostic du mélanome et fondé sur la mensuration )</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <p>1) : Comparer les caractéristiques du mélanome au moment du diagnostic entre les deux groupes.</p> <p>2) : Evaluer la survenue d'effet indésirable de grade 3 et 4 en fonction du traitement dans les deux groupes et d'effets indésirables liés au ganglion sentinelle.</p> <p>3) : Comparer l'évolution entre les deux groupes.</p> <p>4) : Décrire les modalités de prise en charge initiale diagnostique et thérapeutique du mélanome chez des patients âgés 80 ans et plus dans d'autres services de Dermatologie de CHU en France.</p>	Héloïse JOURDAIN sous la responsabilité du Docteur Philippe BERNARD	Patient pris en charge pour un mélanome (confirmé par l'anatomopathologie) entre 2018 et 2022
<b>RUGBY</b>	Etude du taux de récurrence des luxations de l'épaule chez les rugbyman	Début : 21/02/2022 Fin : 15/10/2022	<p>Objectif principal : Montrer qu'il existe moins de récurrence de luxation après prise en charge chirurgicale</p> <p>Objectif secondaire : Evaluer les facteurs prédictifs de récurrence</p>	Mme Mathilde CABOT sous la responsabilité du Pr, Jean-Christophe DAVIET	Joueurs du TOP14, ayant subi un premier épisode de luxation gléno-humérale antérieure de l'épaule, durant leur pratique sportive
<b>EPA-AVC</b>	Le syndrome épaule main post accident vasculaire cérébral	Début 22/02/2021 Fin : 22/09/2022	<p>Objectif Principal : Evaluation de la prévalence du syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur post AVC chez des patients hospitalisés dans le service de MPR (Médecine Physique et réadaptation) du CHU de Limoges à 3 mois de leur AVC</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <p>1) Evaluation de la prévalence du syndrome régional douloureux complexe du membre supérieur post AVC avant la fin de la 4ème semaines de l'accident vasculaire chez des patients hospitalisés dans le service de MPR du CHU de LIMOGES</p> <p>2) Evaluation des facteurs pronostics d'apparition d'un syndrome douloureux régional complexe post AVC des patients ayant présentés un AVC et hospitalisé en MPR au CHU de LIMOGES</p> <p>3) Evaluation de l'évolution de la gravité du SDRC (Syndrome Douloureux Régional Complexe) du membre supérieur chez les patients hospitalisés en post AVC dans le service de MPR au CHU de LIMOGES selon les traitements curatifs reçus au cours de leur séjour.</p> <p>4) Evaluation du traitement préventif du SDRC chez les patients victimes d'AVC et ayant été hospitalisé en MPR au CHU de LIMOGES.</p>	Marine BERRON sous la responsabilité du Pr Jean Christophe DAVIET	Patient ayant présenté un AVC ischémique ou hémorragique hospitalisé en rééducation dans le service de MPR du CHU de LIMOGES avant la fin du premier mois
<b>SYNAP</b>	Évaluation d'un nouveau mode échographie (Angio Plus) pour la détection des atteintes articulaires de la polyarthrite rhumatoïde	Début : 01/03/2022 Fin : 31/08/2022	<p>Objectif Principal : Établir les performances diagnostiques de la technique échographique Angio plus pour la détection des synovites chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <p>1) Comparer les performances diagnostiques de la technique échographique Angio plus par rapport à un gold standard composite comprenant les données clinique et le doppler puissance chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.</p> <p>2) Étudier la reproductibilité inter individuelle de la technique échographique d'Angio plus (facilité d'utilisation de l'Angio Plus)</p>	LACROIX Marine sous la responsabilité Aymeric ROUCHAUD	Patient majeur suivi pour une poly arthrite rhumatoïde

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>DETROIT</b>	Impact du DEcubiTus ventral sur la fonction ventriculaire dROITE au cours du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë.	Début : 01/07/2022 Fin : 01/01/2023	<p>Objectif principal :</p> <p>Comparer la fraction d'éjection du ventricule droit mesurée par ETO 3D en décubitus dorsal puis ventral.</p> <p>Objectifs secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comparer la contraction axiale du ventricule droit entre le décubitus dorsal et ventral</li> <li>2. Décrire l'effet de la mise en DV sur les volumes du VD et du VG</li> <li>3. Comparer l'impact de la mise en DV sur la contraction du ventricule droit mesuré par le strain 2D et 3D.</li> </ol>	Dr Bruno EVRARD	<p>Patients hospitalisés dans le service de Réanimation Polyvalente</p> <p>Groupe cas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous ventilation mécanique</li> <li>- Avec un SDRA modéré à sévère</li> <li>- Et inclus dans la cohorte ARCOFOP (7)</li> </ul> <p>Groupe témoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayant bénéficié d'une échocardiographie de contrôle qualifiée de normale (p. ex. accident vasculaire cérébral ischémique, lésion cérébrale grave, traumatisme thoracique grave) entre janvier 2009 et décembre 2021</li> </ul>
<b>STRAIN RADIAL</b>	Diagnostic du coeur pulmonaire aigu (CPA) par strain radial au cours du SDRA par une approche d'intelligence artificielle	Début : 01/07/2022 Fin : 01/10/2022	<p>Objectif Principal :</p> <p>Evaluer la précision du strain radial à l'aide d'une approche d'apprentissage automatique supervisé pour le diagnostic de CPA.</p>	Dr Bruno EVRARD	<p>Patients hospitalisés dans le service de Réanimation Polyvalente</p> <p>Groupe cas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous ventilation mécanique</li> <li>- Avec un SDRA modéré à sévère</li> <li>- Et inclus dans la cohorte ARCOFOP (7)</li> </ul> <p>Groupe témoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayant bénéficié d'une échocardiographie de contrôle qualifiée de normale (p. ex. accident vasculaire cérébral ischémique, lésion cérébrale grave, traumatisme thoracique grave) entre janvier 2009 et décembre 2021</li> </ul>
<b>PALPAT-IN</b>	PALPatation de l'Artère Temporale au cours de l'artérite à cellules géantes	Début : 23/06/2022 Fin : 31/12/2022	<p>Objectif principal : Description des anomalies de la palpation de l'artère temporale de sujet porteur d'Artérite à Cellules Géantes(ACG),</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Comparaison des données clinico biologiques au diagnostic d'ACG, thérapeutiques et évolutives des patients ACG avec artère temporale pathologique à la palpation versus patients ACG avec palpation normale Parmi les patients ACG avec une artère temporale pathologique à la palpation,</li> <li>2) Comparaison des données clinico biologiques au diagnostic d'ACG, thérapeutiques et évolutives des patients avec biopsie d'artère temporale positive et ceux avec biopsie négative Parmi les patients ACG avec une artère temporale normale à la palpation,</li> <li>3) Comparaison des données clinico biologiques au diagnostic d'ACG, thérapeutiques et évolutives des patients avec biopsie d'artère temporale positive et ceux avec biopsie négative</li> </ol>	Dr, Simon PARREAU sous la responsabilité d'Eric LIOZON	<p>Patient de plus de 50 ans avec un diagnostic prouvé d'artérite à cellules géantes selon les critères ACR et ayant eu une biopsie d'artère temporale suivis dans le service entre 1975 et le 31 mai 2022,</p>
<b>PARADOXE OBESITE</b>	Etude de l'effet de l'obésité sur la survie dans le cancer du sein : étude comparative entre les départements du Littoral (Bénin) et de la Haute Vienne (France)	Début : 01/01/2022 Fin : 01/06/2022	Analyser l'effet de l'Indice de masse corporelle (IMC) dans la survie chez les personnes atteintes de cancer du sein	Vanina POFAGI sous la responsabilité de Tania D'ALMEIDA	Femme âgée de 18 ans et plus ayant eu un diagnostic de cancer invasif et primitif de sein de 2014 et 2018

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
LABO-PHS	Etude de la sensibilité et de la spécificité des précipitines sériques prélevées dans le diagnostic des pneumopathies d'hypersensibilité type poumon de fermier et éleveur d'oiseaux entre 2012 et 2019 au CHU de Limoges	Début : 01/01/2022 Fin : 30/09/2022	<p>Objectif Principal : Déterminer la performance diagnostique (sensibilité, spécificité, Valeur Prédictive Positive (VPP), Valeur Prédictive Négative (VPN), Rapport de vraisemblance positive (RVP), Rapport de vraisemblance négative (RVN) des précipitines sériques réalisées entre 2012 et 2019 au laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de Limoges.</p> <p>Objectifs Secondaires : En cas de Maladie d'Eleveur d'Oiseaux, l'ensemble du panel actuellement réalisé est-il véritablement nécessaire ? Pourrait-on se passer de certaines analyses en première intention ?</p> <p>Description de la clinique, exposition et des examens complémentaires réalisés ayant motivé le praticien à demander la réalisation de l'analyse biologique pour les patients présentant une Pneumopathie d'hypersensibilité ( PHS)</p>	Léonore CHARDIN sous la responsabilité du Pr Boris MELLONI	Patient homme ou femme de plus de 18 ans prélevé au CHU de Limoges du 1 Janvier 2012 au 31 Décembre 2019 pour un dosage du taux de précipitine sérique du panel poumon de fermier et/ou du panel éleveur d'oiseaux
EPDAS	Evaluation de la prévalence de la dénutrition au sein des lieux de stage des étudiants IFSI de 3ème année du CHU de Limoges lors de la semaine de la dénutrition	Début : 14/11/2022 Fin : 18/11/2022	<p>Objectif Principal : Evaluer la prévalence de la dénutrition, définie selon les critères HAS (Haute Autorité de Santé) 2019-21, au sein des lieux de stage des étudiants IFSI (Institut de Formation des Soins Infirmiers ) de 3ème année</p> <p>Objectifs Secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluer le nombre et la proportion de données manquantes notées dans le dossier médical du patient limitant l'évaluation du statut nutritionnel</li> <li>2) Identifier des freins à l'évaluation du statut nutritionnel. Cet objectif ne sera abordé que par la partie « enquête » auprès des personnels soignants du projet.</li> </ol>	Isabelle DELERON sous la responsabilité du Pr Pierre JESUS	Tous patients hospitalisés en structures sanitaires et médico-sociales durant la semaine du 14 au 18 Novembre 2023 et personnel de santé de service (infirmiers, aides soignats)
LLVDP	Les ressentis et le positionnement des pères vis-à-vis de la douleurs conjointe pendant les phases de travail et d'accouchement	Début : 30/11/2022 Fin : 30/06/2023	<p>Objectif principal : Connaître les différents ressentis des pères face à la douleur de leur conjointe pendant les phases de travail et d'accouchement.</p> <p>Objectifs secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Connaître les informations délivrées aux pères et les moyens qui leur semblent nécessaires pour accompagner leur conjointe efficacement afin qu'elles se sentent mieux vis-à-vis de l'accompagnement de la douleur de leur conjointe.</li> <li>2) Connaître le positionnement des futurs pères vis-à-vis de la douleur de leur conjointe en fonction des informations qu'ils ont pu avoir par le biais de séances de préparation à la naissance à la parentalité et en fonction de leur expérience personnelle.</li> <li>3) Connaître le désir des hommes d'être présents en salle de naissance</li> </ol>	Rafaël AUTRAN (étudiante sage femme)	Pères présent lors du travail et de l'accouchement physiologique, médicamenteux ou non, de leur conjointe, à l'Hôpital Mère-Enfant
EPSS	L' Evolution de la profession de sage femme pendant la seconde guerre mondiale	Début : 2022 Fin : 2023	Comparer les compétences et l'autonomie des sages-femmes avant et après la seconde guerre mondiale. Comparer l'exercice de la profession de sages-femmes selon le lieu et le mode d'exercice durant la seconde guerre mondiale. Montrer l'impact des pénuries et des restrictions de liberté sur le travail des ages-femmes. Montrer l'accroissement de la médicalisation des naissances lors de la seconde guerre mondiale et lors du Régime de Vichy.	Marie BARTHELEMY Agnès BARAILLE	Etude bibliographique historique et sociologique

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
RSAX	Les représentations des sages femmes sur l'accouchement sous X	Début :30/11/2022 Fin : 31/05/2023	Objectif principal : Mettre en évidence les représentations que les sages-femmes ont des femmes qui accouchent sous le secret Objectifs secondaires : Montrer que les représentations sociales sont différentes selon les caractéristiques des sages-femmes. Montrer qu'une minorité des sages femmes a conscience des conséquences psychologiques maternelles de l'accouchement sous X. Montrer qu'une grande partie des sages femmes sont favorables au droit d'accès aux origines	Hana BAKOUCH Valérie (étudiante sage femme) Blaise-Gagneraud (cadre sage femme)	Sages femmes diplômées d'Etat à l'Hôpital Mère Enfant de Limoges, du Centre Hospitalier de Saint Junien de la Clinique des émailleur, de la Protection maternelle infantile de haute vienne
ECSSOA	Etat des lieux des connaissances des sages femmes vis-à-vis de l'ostéopathie et place de celle-ci dans leur arsenal thérapeutique	Début : 01/12/22 Fin : 31/03/2024	Objectif principal :Evaluation des connaissances des sages femmes sur l'ostéopathie Objectif secondaire : Mettre en évidence la place de l'ostéopathie dans les possibilités de traitements proposés par les sages-femmes. Mettre en évidence une période préférentielle de prise en charge des patientes (grossesse ou post partum) Mettre en évidence une différence d'orientation vers l'ostéopathie entre les sages-femmes libérales et les praticiennes hospitalières	Maëva VOREUX (étudiante sage femme)	sages-femmes libérales et hospitalières exerçant en Limousin
RCFM	La représentation de la contraception des femmes de moins de 25 ans	Début : 30/11/2022 Fin : 31/07/2023	Objectif principal : Mettre en évidence les représentations sociales de la contraception des femmes de moins de 25 ans Objectif secondaire : Montrer que les représentations sont différentes selon les caractéristiques de la population (classe d'âge, cursus...)	Margaux TEULADE (étudiante sage femme)	Femme âgées de 18 à 25 ans
CPAD	Connaissance des professionnels du SAMU/SMUR sur l'accouchement inopiné à domicile	Début :30/11/2022 Fin : 30/04/2023	Evaluer les connaissances des professionnels du SAMU/SMUR concernant la conduite à tenir en cas d'accouchement physiologique. Evaluer les connaissances des professionnels du SAMU/SMUR concernant la conduite à tenir en cas d'accouchement dystocique. Mettre en évidence les caractéristiques communes aux professionnels du SAMU/SMUR dont le niveau de connaissance concernant la conduite à tenir lors d'un accouchement à domicile inopiné est à améliorer. Evaluer le ressenti des professionnels du SAMU/SMUR face à un accouchement inopiné à domicile	Anna MORLON (étudiante sage femme)	Professionnels du SAMU/SMUR : Médecins, infirmières, ambulancier
TPFC	Tabac et post-partum : prévalence et facteurs de reprise de la consommation tabagique	Début : 30/11/2022 Fin : 31/08/2023	Objectif principal : Mettre en évidence que la prévalence de la reprise de la consommation tabagique est supérieure à 50 % en post partum Objectifs secondaires : 1) Mettre en évidence que la baisse de motivation et autres facteurs influencent la reprise du tabac après l'accouchement 2) Décrire les motivations qui concourent à la non reprise du tabac en post partum	Alexia CHASTAGNIER (étudiante sage femme)	Femme ayant données naissance à un ou plusieurs enfants né-vivants et viables avec des antécédants de diminution de la consommation tabagique ou d'un sevrage complet pendant la grossesse
ECFCDDIP	Evaluation des connaissances des femmes enceintes sur la césarienne et description de leurs attentes en matière d'information délivrée en pré-partum	Début :30/11/2022 Fin : 30/02/2023	Objectif principal : Evaluer le niveau de connaissances des femmes enceintes avec plus de 37 Semaines d'aménorrhée sur la césarienne. Objectifs secondaires : 1) Décrire les attentes en matière d'informations sur la césarienne. 2) Déterminer le moment adéquat pour diffuser l'information aux femmes enceintes. 3) Mettre en évidence le bénéfice psychologique pour les femmes d'avoir une information sur la césarienne pendant la grossesse.	Emma MASTON (étudiante sage femme)	Femmes enceintes majeures avec plus de 37 Semaine d'aménorrhée suivi à l' Hôpital Mère Enfant.
ECFC	Etat des lieux des connaissances des femmes de 18 à 25 ans n'ayant pas eu de consultation de contraception	Début : 2022 Fin : 2023	Faire un état des lieux des connaissances sur la contraception des jeunes femmes de 18 à 25 ans sans suivi gynécologique de contraception. Répertorier les sources d'informations sur la contraception des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Mettre en évidence les attentes des jeunes femmes de 18 à 25 ans en matière d'informations sur la contraception. Transmettre les informations de manière à toucher le plus grands nombre. Permettre d'acquérir une meilleure pratique professionnelle.	Chanelle CHENIOT (étudiante sage femme)	Femme de 18 à 25 ans

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>QSPMA</b>	Questions sociétales posées par la procréation médicalement assistée du XX siècle à nos jours	Début : 30/11/2022 Fin : 30/11/2023	Mettre en évidence la concomitance de la transformation de la PMA (Procréation médicalement Assistée) des évolutions sociétales en rapport avec des questionnements éthiques, des normes familiales et procréatives. Mettre en évidence le passage d'une PMA centrée sur un raisonnement médical à une PMA s'adaptant aux demandes sociétales. Montrer que les adaptations juridiques dans le domaine de la PMA ont été rendues nécessaires de par l'évolution des normes et questions sociétales.	Nina CHABREYROU (étudiante sage femme)	le recueil des données se fait sur des documents ressources et non sur des données patients
<b>SDGS</b>	Suivi et déroulement de la grossesse chez les femmes en situation de précarité	Début : 01/12/2022 Fin : 01/12/2023	Objectif principal : Décrire les modalités du suivi de la grossesse en situation de précarité (régularité, lieu du suivi, renoncement à des soins,...) Objectifs secondaires : 1) Décrire le déroulement de la grossesse en situation de précarité. 2) Identifier les pathologies de la grossesse les plus fréquentes en situation de précarité. 3) Mettre en évidence les freins à un suivi régulier de la grossesse	Clara COURSAC (étudiante sage femme)	Femme enceinte en situation de précarité
<b>EPFUH</b>	Etude descriptive de la population des femmes enceintes consultant aux urgences obstétricales de l'Hôpital Mère Enfant (HME) de Limoges	Début : 01/12/2022 Fin : 01/12/2023	Objectif Principal : Mettre en évidence les motifs de consultation en urgence les plus fréquents à l'HME Objectifs secondaires : 1) Evaluer le taux de consultations en urgence non justifiées à l'HME 2) Déterminer les caractéristiques communes des patientes qui consultent pour des symptômes bénins	Janille DEXET (étudiante sage femme)	Femmes enceintes entre 14 et 41 semaines consultant en salle de naissance, sans rendez vous.
<b>ECCHOH</b>	Etude comparative des circonstances obstétricales autour de l'hémorragie de la délivrance à l'Hôpital Mère Enfant (HME) en 2021.	Début : 01/03/2022 Fin : 30/06/2024	Faire un état des lieux des circonstances obstétricales présentes en pré et per-partum lors de la survenue d'une hémorragie de la délivrance chez les patientes de l' HME de Limoges. Montrer que les patientes ayant une hémorragie de la délivrance présentent des circonstances obstétricales communes en perpartum (période allant de 6 mois de grossesse à 7 jours après ) et pré-partum (avant l'accouchement).	Natacha REGIS (étudiante sage femme)	Femmes ayant eu une hémorragie de délivrance, femme n'ayant pas eu une hémorragie de délivrance en 2021
<b>VGOF</b>	Violences gynécologiques et obstétricales dans la vie des femmes	Début : 30/11/2022 Fin : 31/05/2023	Evaluer la prévalence actuelle des VGO (Violences gynécologiques et Obstétricales) au sein de la population féminine de l'ancienne région limousin. Répertorier les types de VGO. Mettre en évidence des facteurs favorisant des pratiques déviantes et des caractéristiques communes à ces femmes	Charlène CADIOT (étudiante sage femme)	Population féminine de 18 à 65 ans ayant un suivi gynécologique/obstétrical
<b>COM OBS NEO APRES CHIR PAR BY VER CHIR PAR SLEEVE</b>	Chirurgie bariatrique et grossesse	Début : 01/01/2021 Fin : 31/09/2023	Objectif principal : comparer le taux de complications : de la grossesse, de l'accouchement, de l'état du nouveau né après 2 techniques de chirurgie : bypass et sleeve. Objectifs secondaires : Evaluer les conséquences d'une chirurgie bariatrique dans la survenue de grossesses ultérieures. Montrer qu'il existe des différences de complications dans chaque groupe de chirurgie selon la classe d'âge, L'Indice de Masse Corporel (IMC) et la parité.	Joffre LEA (étudiante sage femme)	Femmes enceintes ayant subies une chirurgie bariatrique (bypass ou sleeve) dont l'indication était l'obésité (IMC supérieure ou égale à 40 ou l'IMC supérieur ou égale à 35 avec comorbidité. Avec une grossesse unique spontanée ou non.
<b>HyménoLim</b>	Place des facteurs bloquants dans la décision d'arrêt d'une immunothérapie allergénique aux venins d'hyménoptères au CHU de Limoges	Début : 01/11/2022 Fin : 07/04/2023	Objectif principal : Le taux de Facteurs Bloquants (Anticorps Protectors ) au terme d'une Immunothérapie allergénique (ITA) est il prédictif de l'efficacité de celle-ci? Objectifs Secondaires : 1) Décrire les caractéristiques des patients désensibilisés au CHU de Limoges 2) Décrire le taux de tryptasémie basale chez les patients désensibilisés au CHU de LIMOGES 3) Evolution des facteurs cliniques et biologiques entre l'initiation d'une immunothérapie et son arrêt. 4) Comparaison de l'évolution entre le début et le terme d'une ITA des facteurs clinico-biologiques, en fonction du type d'hyménoptères. 5) Déterminer la quantité d'immunoglobulines G4 dans les facteurs bloquants au termes de l'ITA	Julie POULAT sous la responsabilité du Docteur Elisabeth BELLET-FRAYSSE	Patients ayant bénéficié d'une immunothérapie aux venin d'hyménoptères au CHU de Limoges, d'un dosage de facteurs bloquants à l'arrêt de l'immunothérapie

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>RLRV</b>	Résultats à long terme des réparations de plaies des voies lacrymales au CHU de Limoges et revue de la littérature	Début : 01/01/2021 Fin : 31/10/2022	Objectif principal : Absence de larmolement à distance de la chirurgie reconstructrice Objectifs secondaires : 1) Absence de larmolement en l'absence de reconstruction des voies lacrymales 2) Épidémiologie des plaies de voies lacrymales	Rodolphe POULENARD sous la responsabilité du Pr Yves ROBERT	Patients ayant eu des plaies des voies lacrymales opérées au CHU de LIMOGES de 2005 à Mai 2022
<b>HEPATOCOAG</b>	Incidence et sévérité des troubles de coagulation post-opératoire dans la chirurgie hépatique : quelles implications pour l'analgésie post opératoire ?	Début : 01/01/2023 Fin : 01/04/2023	Objectif principal : Identifier des facteurs de risque pré opératoire de la coagulopathie dans la chirurgie hépatique Objectif secondaire : Identifier des facteurs de risques pré-opératoire de coagulopathie dans la chirurgie hépatique	Lea LEGROS sous la responsabilité du Pr Nathalie NATHAN DENIZOT	Patient majeur ayant eu une résection hépatothique par laparotomie de 2017 à 2021
<b>MENINGIORECIDIVE</b>	Etude des facteurs de récurrence des méningiomes	Début : 02/01/2023 Fin : 30/12/2023	Principal : Evaluer le potentiel des paramètres histologiques, cliniques et radiologiques comme facteurs indépendants ou combinés pouvant prédire la récurrence des méningiomes Objectifs Secondaires : 1) Compiler les données radiologiques, cliniques et biologiques dans une base de données 2) Etudier la faisabilité d'un modèle prédictif de la récurrence	François LABROUSSE	Patients âgés de plus de 18 ans opérés entre 1990 et 2019 qui ne sont pas opposés au recueil de leurs données. Patient ayant un diagnostic de méningiome. Patient ayant des données d'histologie, cliniques et d'imagerie disponibles
<b>CYCLECELLMEN</b>	Etude des marqueurs moléculaires du cycle cellulaire dans des méningiomes récidivants ou non récidivants	Début : 13/02/2023 Fin : 30/06/2023	Objectif Principal : Décrire les mutations génétiques tumorales des méningiomes non récidivants, récidivants, et leur récurrence associée Objectif Secondaire : Décrire l'incidence des mutations tumorales en fonction des autres caractéristiques clinico-biologiques	François LABROUSSE	Patients âgés de plus de 18 ans qui ne sont pas opposés au recueil de leur données. Patient ayant un diagnostic de méningiome. Patient ayant des données d'histologie, cliniques et d'imagerie disponibles
<b>MENINGIOHETEROGENE</b>	Etude de l'hétérogénéité histologique et moléculaire des méningiomes récidivants	Début : 06/02/2023 Fin : 30/06/2024	Principal : Rechercher des marqueurs moléculaires impliqués dans la récurrence des méningiomes et pouvant différer en fonction de la capacité proliférative du contingent cellulaire. Secondaire : Améliorer la qualité de la prise en charge pré analytique des prélèvements fixés au formol	Antonio JORQUERA Interne de spécialité sous la responsabilité de Mathilde DUCHESNE	Patients âgés de plus de 18 ans qui ne sont pas opposés au recueil de leur données. Patient ayant un méningiome récidivant avec disponibilité de la récurrence associée, comportant au moins une zone de forte capacité proliférative et une zone de moindre capacité proliférative,
<b>MENINGIOSIGNATURE</b>	Etude des signatures d'expressions géniques impliquées dans la récurrence des méningiomes	Début : 30/01/2023 Fin : 30/06/2024	Principal : Analyser quelles signatures transcriptomiques régissent la récurrence et la progression des méningiomes, en comparant le transcriptome de méningiomes primitifs récidivants vs. non récidivants, de récurrences associées de même grade ou de grade plus élevé et de méningiomes de novo. Secondaire : 1) Constituer une base de données rétrospective et prospective de méningiomes regroupant les données cliniques, radiologiques, histologiques et moléculaires. 2) Analyser l'association des signatures transcriptomiques avec les données cliniques, histologiques et radiologiques des patients, notamment avec le critère d'agressivité tumorale qu'est l'invasion cérébrale, dont la corrélation avec certains critères de l'IRM a récemment été montrée par l'équipe de neuro-radiologie du CHU de Limoges 3) Analyser à partir des signatures transcriptomiques, s'il existe des gènes précurseurs de la récurrence et de la progression, qui pourraient constituer : - Des outils de prédiction de routine de la récurrence et de la progression pour la prise en charge des patients et leur suivi en clinique - Des cibles potentielles de traitement pour les tumeurs les plus agressives	Anne Claire BEAUJEU sous la responsabilité de Karine DURAND, Mathilde DUCHESNE, Henri SALLE	Hommes âgés de plus de 18 ans avec un méningiome au niveau de la voûte du crâne.

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
Anti-HER	Impact du mode d'administration des anti-HER2 (sous cutané versus intraveineuse) sur la satisfaction des patients et externalisation à domicile notamment possible par l'infirmière de pratiques avancées.	Début : 2022 Fin : 2023	<p>Objectif principal : Evaluation de la satisfaction des patients</p> <p>Objectifs Secondaire : 1) Evaluation de la satisfaction des patients en fonction des sous groupes suivants : -Lieu de vie - Mode de vie, -IPA (Infirmière de pratiques avancée) versus IDE (Infirmière Diplômée d'état), Hôpital versus Hospitalisation à domicile (HAD) 2) Evaluation des toxicités en fonction des sous groupes suivants : -IPA vs IDE, Hôpital vs HAD 3) Analyse médico-économique</p>	Elise DELUCHE	Femme ou Homme âgé( e ) de plus de 18 ans ayant un cancer du sein (HER2 positif) traité par trastuzumab ou trastuzumab-pertuzumab au CHU de LIMOGES
RMCS	Ressenti des mères confrontés à la séparation avec leur enfant à la naissance	Début :30/06/2022 Fin : 30/01/2023	<p>Objectif principal : Décrire le ressenti des mères séparées de leur enfant à la naissance en réalisant un état des lieux de la présence des sentiments de culpabilité, d'incompétence et d'ambivalence dans les 1er jours du post-partum</p> <p>Objectifs secondaires : 1) Faire un état des lieux de la mise en place des interactions précoces pour la mère séparée de son enfant à la naissance dans les 1ers jours du post-partum à l'HME de Limoges 2)Décrire, estimer, mesurer, la perception de la mère vis à vis du rôle du co-parent dans l'aide à la rencontre de leur enfant 3)Décrire La perception de la mère vis-vis de l'accompagnement des professionnels de santé dans la mise en place des interactions précoces.</p>	Noémie HUAU (étudiante sage femme)	Femmes en train d'accoucher, femmes ayant données naissances, séparées de leur nouveau né à la naissance
ELFD	Etat des lieux des besoins et attentes des femmes pour la prise en charge de la douleur lors du travail et de l'accouchement	Début : 30/11/2022 Fin : 2023	<p>Objectif principal : Etablir un état des lieux des attentes des femmes enceintes en Haute Vienne au sujet de la prise en charge de leurs douleurs lors de l'accouchement</p> <p>Objectifs secondaires : 1) Comparer les attentes des femmes en fonction de la parité 2) Comparer les attentes des femmes en fonction du type d'établissement hospitalier 3) Comparer les attentes des femmes en fonction de leur contexte socio-démographique</p>	Adèle LINARD (étudiante sage femme)	Femme enceinte consultant au dernier mois de grossesse dans le Hôpital Mère Enfant, Clinique des Emailleur et et le CH de Saint Junien
EPCMS	L'évolution de la prise en charge des mutilations sexuelles Féminines (MSF), en Europe XIX ème siècle à aujourd'hui	Début : 2022 Fin : 2023	<p>Objectif principal : Montrer l'évolution de la prise en charge des Mutilations sexuelles Féminines (MSF) en Europe et en France depuis le XIX ème siècle.</p> <p>Objectifs Secondaires : 1)Montrer que l'Europe a eu une participation active dans la mutilation sexuelle des femmes, en la justifiant par des raisons médicales. 2) Montrer le rôle des religions dans les MSF 3)Evaluer le rôle de l'évolution de la place des femmes dans la société dans l'évolution de la prise en charge des femmes mutilées sexuellement.</p>	Paul GOUDOUR (étudiant sage femme)	Etude bibliographique socio historique
IMAOA	Ischémie mésentérique aiguë occlusives artérielles : Protocole patient au sein du groupement hospitalier Territorial du Limousin.	Début : 19/04/2021 Fin : 19/04/2022	<p>Objectif principal : Proposition d'un parcours de soins pour l'IMA occlusive artérielle;</p> <p>Objectifs secondaires : 1) Décrire les caractéristiques épidémiologiques et la prise en charge des patients 2) Evaluation du taux de mortalité, taux de résection digestive et taux de revascularisation.</p>	Mr Antonin MINSTER sous la responsabilité de Muriel MATHONNET	Patients pris en charge pour une ischémie mésentérique aiguë occlusive artérielle au CHU de Limoges et au CH de Brive sur la période de Janvier 2016 à Juin 2021,
CLL3S	Est-ce que notre système immunitaire produit naturellement des lymphocytes B apparentés à ceux de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) au cours du vieillissement ?	Début : 05/04/2022 Fin :NA/11/2022	Description du répertoire BCR (Anticorps présent à la surface du lymphocyte B) normal au cours de l'âge	Marine DUPONT sous la responsabilité du Dr David RIZZO	Patient adulte sans antécédent d'hémopathie et sans traitement immunosuppresseur

IDENTIFICATION			FINALITE / OBJECTIF	INTERVENANTS	
Acronyme	Titre	Dates de début et de fin du traitement	Objectif(s)	Nom du responsable scientifique	Catégorie de personnes concernées (2)
<b>AntiHTA</b>	Dépistage dans l'urine de la prise de médicaments contre l'hypertension artérielle	Début : 11/04/2022 Fin : 15/10/2022	Valider la capacité de la méthode de screening à identifier la présence ou l'absence de molécules anti hypertensives dans l'urine	Caroline MONCHAUD sous la responsabilité de Pr Pierre MARQUET	Patient traité par une molécule antihypertenseur et admis depuis au moins 48 heures au CHU de Limoges
<b>SNULM</b>	Suivi neuro-urologique des patients présentant une atteinte médullaire, hors Sclérose en plaque Etude épidémiologique transversale des patients du service de Médecine Physique et de réadaptation du CHU de LIMOGES	Début : 01/02/2022 Fin : 22 / 10 /2024	Objectif Principal : Evaluer la prévalence des complications urologiques chez des patients blessés médullaires et spina bifida (malformation du rachis) suivis dans le service de MPR (Médecine Physique Réadaptation) du CHU de LIMOGES Objectifs Secondaires : 1) Évaluer les différences entre le suivi organisé des patients et le suivi des recommandations du GENULF (Groupe d' Etude de Neuro-Urologie de Langue Française) 2) Identifier les facteurs associés à la survenue d'une complication de l'appareil urinaire	Marine BERRON sous la responsabilité du Dr Maxence CAMPAGNAT	Patient adulte ayant une lésion médullaire, spina bifida et ayant un suivi urodynamique au CHU de LIMOGES