DESCRIPTION DU GESTE

La **recherche d'oxyures** (petits vers blancs souvent à l'origine de démangeaisons anales nocturnes) ou de **Tænia** nécessite un prélèvement :

- le Scotch®-test anal.

Il sera effectué le matin au moyen de cellophane adhésive (Scotch®) appliquée pendant quelques secondes sur la marge de l'anus pour récupérer les œufs des vers potentiellement présents à ce niveau.
Ce prélèvement peut être réalisé au centre de prélèvement (à partir de 9 h) ou dans le service d'hospitalisation.

EST-IL ASSOCIE A DES PHENOMENES DOULOUREUX ?

Non, ce geste est indolore

PEUT-IL Y AVOIR DES COMPLICATIONS EVENTUELLES ?

Non

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LE GESTE

La sensibilité de cette recherche dépend directement des conditions de réalisation du prélèvement, c'est pourquoi il est indispensable que vous suiviez les instructions suivantes :

La veille au soir :

- prendre une douche avec toilette anale
- éviter toute prise de suppositoire

Le matin :

- ne pas aller à la selle
- ne pas faire de toilette anale
- venir au centre de prélèvement le plus tôt possible à partir de 9h (sauf si le prélèvement est réalisé par l'infirmière)

S'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la propreté, essayez dans la mesure du possible de respecter les mêmes règles.

CE QU'IL FAUT EN ATTENDRE ET NE PAS EN ATTENDRE :

Ce prélèvement permet de mettre en évidence des œufs d'oxyure ou de *Tænia*, parasites pour lesquels un traitement efficace peut être administré.

Cependant, une recherche négative n'exclut pas la présence d'un de ces parasites.

Si les précautions ci-dessus ne sont pas respectées, une recherche négative n'est pas significative.