LIQUIDE ARTICULAIRE ET BACTERIOLOGIE

PREPARER

Cytologie → Tube à bouchon vert foncé

Vert — Héparine de sodium (NH)

Recherche de germes
(Mise en culture)

Ensemencement en **flacons d'hémoculture**
= Méthode **optimale**

Adultes

Flacon d'hémoculture aérobie (vert)
Flacon d'hémoculture anaérobie (orange) → **Ne pas introduire d'air**

Ne pas coller l'étiquette sur le code à barre

Pédiatrie

et / ou

Incolore — Seringue

et / ou

Cape rouge — Pot de prélèvement



Peau / Os / Articulation / Collection

Localisation : .....

☐ Plaie superficielle ☐ Cicatrice opératoire ☐ Tissu mou
☐ Escarre ☐ Ulcère ☐ Furoncle ☐ Phlegmon ☐ Kyste
☐ Hématome ☐ Morsure ☐ Griffade ☐ Vésicule ☐ Phanère
Abcès : ☐ cutané ☐ osseux ☐ paroi ☐ autre : .....
Biopsie ☐ cutanée ☐ osseuse ☐ autre : .....
Orifice : ☐ cathéter ☐ drain ☐ autre : .....
Liquide ☐ articulaire ☐ de redon ☐ autre : .....
☐ Autre, préciser : .....

Feuille de demande

Renseigner la localisation
Cocher la case « liquide articulaire »

Une seule feuille de demande par liquide articulaire

NB : S'il reste du liquide, le transmettre au laboratoire.

Pour conservation au laboratoire à +4°C, pour des recherches complémentaires type Biologie Moléculaire

En cas de doute, joindre un biologiste
Dr N HIDRI
ou Poste 56160
Secrétariat BVH