

AIDE A LA PRESCRIPTION : RECHERCHE DE FILARIOSE

Instruction

PARA PREA 0015 F

Approuvé par : MARIE LAURE DARDE PU-PH

Responsable du service de Parasitologie-Mycologie

Page 1/1


NOTION DE SEJOUR PROLONGE

AFRIQUE INTERTROPICALE, (CAMEROUN, BENIN, GABON, CONGO, NIGERIA...)

- AFRIQUE INTERTROPICALE
- MADAGASCAR
- INDE, ASIE DU SUD-EST
- Amérique du Sud
- Pacifique, Océan indien : Polynésie, Mayotte ...

PRURIT

+



sous la peau / sous la conjonctive

Loase?

+/- NODULES

sous cutanés

+/- TROUBLES OCULAIRES

Onchocercose?



LYMPHOEDEME(S) (surtout au niveau des membres inférieurs)

- +/- ADENOPATHIE(S) de la racine des membres
- +/- épisode(s) de lymphangite aiguë +/- asthénie - chylurie
 - Filariose lymphatique ?

Des formes asymptomatiques peuvent exister pour toutes ces filarioses. Une hyperéosinophilie, généralement associée, est à rechercher.







<u>Demander :</u>

- une « filariose sérologie » tube SST (une sérologie négative n'exclut pas le diagnostic)
- une recherche directe de microfilaires

Recherche directe sur du **sang prélevé à 12h** sur tube EDTA (prévenir le service de Parasitologie) Recherche directe sur biopsie cutanée exsangue faite au Centre de Prélèvements

Recherche directe sur :

- **sang prélevé à 12h** sur tube EDTA (Pacifique, Asie : *Brugyia malayi, Wuchereria bancrofti var. pacifica*)
 - sang prélevé à 23h sur tube EDTA (Afrique : W. bancrofti)

(prévenir le service de Parasitologie)

 pour Wuchereria bancrofti: une recherche d'antigène circulant filarien prescrire: sérologie filariose (envoi au CHU de Toulouse)

