

AIDE A LA PRESCRIPTION : RECHERCHE D'UNE LEISHMANIOSE VISCERALE

Instruction

PARA PREA 0016 F

Approuvé par : MARIE LAURE DARDE PU-PH

Responsable du service de parasitologie-mycologie

Page 1/1

- NOTION DE SPLENOMEGALIE + FIEVRE
- ET PANCYTOPENIE (anémie, leucopénie ++)
+/- ADENOPATHIE
+/- HEPATOMEGALIE

Rq: Les jeunes enfants et les immunodéprimés sont les plus fréquemment concernés



SEJOUR EN ZONE D'ENDEMIE

BASSIN MEDITERRANEEN (France : Corse, PACA, Cévennes l'été, Maghreb, Proche Orient)
 - ASIE (Chine, Inde, Bangladesh ...)
 - AFRIQUE : EST ++ (Soudan), OUEST
 - AMERIQUE DU SUD (Brésil ...)

Pour plus de renseignements, , appeler le service de Parasitologie

Associer les 2 prescriptions suivantes :

- « Leishmaniose recherche directe » (recherche microscopique, PCR, culture) sur sang EDTA ou sur <u>mœlle osseuse</u> (prélevée sur 1 tube EDTA) : la PCR sur sang EDTA a une sensibilité équivalente à la recherche sur moelle osseuse.
- « Leishmaniose sérologie » tube SST (sensibilité >95% chez les patients immunocompétents ; environ 50% au cours du SIDA)

