



AIDE A LA PRESCRIPTION : HYPEREOSINOPHILIE CHEZ UN PATIENT APRES SEJOUR EN ZONE TROPICALE

Instruction

PARA PREA 0021 F

Approuvé par :
MARIE LAURE DARDE
PU-PH
Responsable du service
de parasitologie mycologie

Page 1/1

Cette démarche diagnostique ne concerne que les étiologies parasitaires d'hyperéosinophilie

AFRIQUE + Madagascar

**AMERIQUE
LATINE**

**EXTREME
ORIENT**

MOYEN ORIENT

*Anguillulose, Ascaridiose, Ankylostomose,
Trichiurose, ou autres helminthoses intestinales
(oxyure, ténia...)*

*Distomatoses hépatiques,
Cysticercose, Toxocarose, Hydatidose,
Trichinellose, Anisakidose*

DEMANDER :

- Parasitologie des selles X3 à 2-3 j d'intervalle (acheminer rapidement au laboratoire) à renouveler 3 semaines après si négatives

- Scotch test anal

- Sérologies (en fonction du contexte):
distomatose, cysticercose, toxocarose,
hydatidose, trichinellose, anisakidose

Brésil +++

Si baignade en eau douce

+/- hématurie

Schistosomose intestinale

Schistosomose urinaire

DEMANDER :

- Parasitologie des urines après effort physique renouveler 1 mois après si négative

- Sérologie : schistosomose

- Biopsie vésicale
si bilan négatif et forte suspicion

DEMANDER :

- Parasitologie des selles x3 à 2-3 j d'intervalle, à renouveler 3 semaines après si négative

- Sérologie : schistosomose

- Biopsie de muqueuse rectale
si bilan négatif et forte suspicion

Si baignade ou marche (Asie) en eau douce

CHEZ UN RESIDENT OU APRES UN SEJOUR PROLONGE EN ZONE RURALE, EVOQUER EN PLUS

Afrique intertropicale

Nord de l'Amérique du Sud

Golfe de Guinée

Loase

Onchocercose

Filariose lymphatique

DEMANDER :

- Recherche de microfilarémie à 12h

- Sérologie :
filariose

DEMANDER :

- Sérologie : filariose

- Biopsie cutanée exsangue
(voir avec le service de parasitologie pour sa réalisation)

DEMANDER :

- Recherche de microfilarémie à 23h et/ou 12h

- Sérologie : filariose